

مشخصات دارو:

ترکیبات:

- هر پیمانه (۵ میلی لیتر) حاوی:
- سودوافدرین هیدروکلراید ۱۰ میلی گرم
- کلرفنیرامین مالئات ۰/۲۷ میلی گرم
- شربت اگزاکید® (شربت سرماخوردگی کودکان) ساخت شرکت داروسازی اکسیر به صورت محلول شفاف، قرمز رنگ، با طعم و بوی گیلان، در حجم های ۶۰ و ۱۲۰ میلی لیتری همراه با برگه راهنما به بازار عرضه می‌گردد.

دسته دارویی:

آنتی هیستامین دکونژستانت^(۱)

موارد مصرف:

برای تسکین علائم سرماخوردگی و آلرژی شامل: گرفتگی و آبریزش بینی به کار می رود.^(۱)

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

- در صورت ابتلای کودک به بیماری قلبی، آسم و بیماری‌های عصبی
- در صورت مصرف هر داروی دیگری به خصوص آنتی کولینرژیک‌ها، داروهای افزایش دهنده فشارخون، سرکوب کنند‌ها یا محرک‌های سیستم عصبی مرکزی.^(۲،۳)

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هر گونه سابقه حساسیت به دارو (کلرفنیرامین و سودوافدرین) و ترکیبات آن
- در صورت حساسیت به سایر آنتی هیستامین ها
- مصرف همزمان با سایر آنتی هیستامین ها
- در صورت وجود هر گونه نارسایی عروق کرونر و فشار خون بالا
- از مصرف همزمان با داروهای مهارکننده ی آنزیم مونوآمین اکسیداز خودداری نمایید. بعد از ۱۴ روز قطع مصرف مهارکننده های مونوآمین اکسیداز مصرف این دارو بلامانع است.^(۲،۳)

هشدارها و موارد احتیاط:

- در زمان مصرف این دارو رعایت نکات زیر توصیه می شود:
- دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنید.
- در موارد زیر مصرف دارو باید با احتیاط و زیر نظر پزشک صورت گیرد:
- صرع، انسداد در دستگاه گوارش، احتیاس ادراری، گلوکوم زاویه بسته چشم، احتیاس ادراری^(۲)
- دیابت، پرکاری تیروئید، مشکلات قلبی نظیر بیماری های ایسکمیک قلب، فشارخون بالا، افزایش فشار داخل چشم^(۲)
- در صورت نارسایی کبد و کلیه با احتیاط مصرف شود.
- کودکان با سن پایین کم به اثرات این دارو بیشتر حساس می باشند. مصرف دارو ممکن است باعث افزایش فشارخون، کاپوس های شبانه، هیجان غیرعادی، عصبانیت، بی قراری و تحریک پذیری شود.^(۱)

تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان با داروهایی نظیر آکلیدینوم، اسپری بینی آزالاستین، مشتقات ارگوآمین، گلوکاگون، داروهای استنشاقی گلیکوکورتیکوئید و اپیآتروپیوم، مهارکننده های مونوآمین اکسیداز، نیتروگلیسرین، اورفنادین، اکستاتامید، پتاسیم کلراید، تالیدوماید، تیوتروپیوم، اومگلیدوم.^(۱)

آتروپین، بتالانگرا، انتاکایون، ارگوآمین، لینزولید، مگلوامید، بتاهیستین.^(۲)

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک و یا داروساز خود را مطلع سازید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند؛ اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

در کودکان ۲ تا ۵ سال: نصف تا یک قاشق مربا خوری هر ۴ تا ۶ ساعت بر حسب نیاز

در کودکان ۶ تا ۱۱ سال: دو قاشق مربا خوری هر ۴ تا ۶ ساعت بر حسب نیاز

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه مهمی این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

بی قراری، سردرد، افزایش فشارخون، افزایش ضربان قلب، بی خوابی، تهوع و استفراغ، تاری دید، توهم بینایی،

خشکی دهان، اختلال در سیستم گوارشی، اختلال در حرکات، احتیاس ادراری، بثورات جلدی و کبیر^(۲)

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته جداً خودداری کنید.
- در دمای اتاق، دور از نور و گرما نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.^(۱)

References:

1. Lexicomp Drug information handbook, 2017- 2018, 26th edition, Pages: 1943,1768, 480
2. BNf 74, 2018 , Pages: 1100, 272, 1406, 1294