



۶. دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

۵. از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

۴. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

۳. قبل و بعد از هر بار مصرف، درب بطری را محکم ببندید.

۱. قبل از مصرف، بطری را به خوبی تکان دهید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده توسط پزشک، با مرکز فوریت های پزشکی تماس بگیرید.

مسمومیت:

همچنین در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی دیگر که در این برگه راهنما ذکر نشده است، موضوع را به پزشک خود اطلاع دهید.

سو. هاضمه، تهوع یا استفراغ.

درد یا ناراحتی شکم یا معده (خفیف تا متوسط)، اسهال، گیجی، خواب آلودگی یا سبکی سر، سردرد (خفیف تا متوسط)، سوزش سر دل،

خود اطلاع دهید:

درمان به خودی خود برطرف می شوند، با این وجود چنان چه هر یک از عوارض زیر ادامه پیدا کرد یا غیر قابل تحمل بود، موضوع را به پزشک

– دسته دیگری از عوارض جانبی که ممکن است رخ دهد، آن هایی هستند که معمولاً نیازی به مراقبت های پزشکی ندارند و با ادامه

سریع و نامنظم، تورم پلک ها، صورت، زبان یا لب ها)

تنگی نفس، تنفس سریع و نامنظم، خس خس سینه، درد قفسه سینه، از حال رفتن، تغییر رنگ صورت، تندی ضربان قلب یا نبض

و آنفلیاکسی (این عارضه بسیار نادر و شامل علائم زیر است:

پاها، افزایش غیر عادی وزن، سوزش و درد شکم (شدید)، مدفوع خونی یا سیاه، بثورات جلدی، سردرد (شدید)، تورم انگشتان و

سو. هاضمه (طولانی یا شدید)، سوزش و درد شکم (شدید)، ضمن قطع دارو به پزشک مراجعه کنید:

– در صورت بروز هر یک از عوارض زیر، ضمن قطع دارو به پزشک مراجعه کنید:

فرد دیده نمی شود، بعضی از این عوارض در صورت بروز ممکن است نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشد:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیزشود. اگر چه تمام این عوارض در یک

عوارض جانبی:

ایمنی و کارایی ایبوپروفن در کودکان زیر ۶ ماه به اثبات نرسیده است.

نوزادان زیر ۶ ماه: مقدار و نحوه مصرف بایستی توسط پزشک تعیین گردد.

علائم، پزشک ممکن است مقدار مصرف روزانه دارو را کاهش دهد.

در صورت نیاز و بنا به دستور پزشک می تواند تا ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز افزایش پیدا کند و بعد از بهتر شدن

کودکان ۶ ماهه تا ۱۲ ساله: درابتدا ۴۰-۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه ۴-۳دوز منقسم مصرف می شود که این مقدار

عالیم، پزشک ممکن است مقدار مصرف دارو را کاهش دهد.

بزرگسالان و نوجوانان: ابتدا به میزان ۳۲۰۰-۱۲۰۰ میلی گرم روزانه در ۴-۳ دوز منقسم مصرف می شود. در صورت بهتر شدن

– در درمان آرتريت:

می تواند در صورت نیاز هر ۶-۴ ساعت تکرار شود.

کودکان ۶ ماهه تا ۱۲ ساله: ۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن برای تب کمتر از ۳۹° C و ۱۰ میلی گرم برای تب های بالاتر که

بزرگسالان و نوجوانان: ۴۰۰-۲۰۰ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت در صورت نیاز.

– در درمان تب یا درد:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند و باید دقیقاً از آن پیروی کرد، ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

مقدار و نحوه مصرف:

سیکلوکسیپورین، لیتیم، متوترکسات، مدرهای پتاسیمی، ACEIs.

فرآورده های ضد انعقاد خون، آنتی پلاکت ها، NSAIDs آمینوگلیکوزیدها دفرازیروکس، دایبیکتران دیگوکسین، بیس فسفونات ها،

مصرف هم زمان با داروهای ذیل ممکن است باعث کاهش یا افزایش اثر داروها گردد:

تداخلات دارویی:

۸. در صورتی که ناحیه دردناک، قرمز یا متورم بود به پزشک مراجعه کنید.

۷. اگر برای پایین آوردن تب از این دارو استفاده می کنید و تب بعد از سه روز قطع نشد یا دوباره برگشت، به پزشک مراجعه کنید.

۶. در صورت عدم بهبودی و یا بدتر شدن علائم به پزشک مراجعه کنید.



ایبوکسیر®

ایبوپروفن (سوسپانسیون خوراکی ۱۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر)

IBUXIR®

Ibuprofen (100mg / 5ml oral suspension)

مشخصات دارو:

ایبوکسیر® شرکت داروسازی اکسیر به صورت سوسپانسیون خوراکی حاوی ۱۰۰ میلی گرم ایبوپروفن در هر ۵ میلی لیتر در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری و جعبه های تک عددی همراه با پیمانه و برگه راهنما به بازار عرضه می گردد.

دسته دارویی:

ضد التهاب غیر استرویدی (NSAIDs)

راهنمایی های عمومی:

۱. قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود در موارد زیر مشورت نمایید:

– وجود هر نوع سابقه حساسیت به آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و یا مواد دیگر نظیر مواد غذایی، مواد محافظ،

رنگ ها و غیره.

– ابتلایا سابقه ابتلا به خونریزی های گوارشی، بیماری های التهابی دستگاه گوارش مانند کرون، کولیت، زخم معده یا دوازدهه، آسم (تنگی نفس)، لوپوس اریتماتوز، ناراحتی های قلبی، بالا بودن فشارخون، بیماری های کلیه، دیابت ملیتوس (دیابت شیرین)، هپاتیت یا

دیگر بیماری های کبدی، هموفیلی، آئمی(کم خونی)، کاهش تعداد پلاکت های خون، وجود زخم یا نقاط سفید رنگ در دهان.

– در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر:

کورتیکواستروئیدها، گلوکوکورتیکوئیدهای خوراکی، کورتیکوتروپین، مکمل های پتاسیم، داروهای ضد انعقاد خون، هپارین، داروهای

ترومبولیتیک (مثل استرپتوکیناز)، تریامترن، آسپیرین، والپروئیک اسید، سیکلوسپورین، لیتیم، متوترکسات.

۲. سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

۳. قبل و بعد از هر بار مصرف، پیمانه را بشویید.

۴. از مصرف دارو بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری کنید.

۵. از مخلوط کردن سوسپانسیون ایبوپروفن با آنتی اسید یا هر گونه مایع دیگری قبل از مصرف خودداری نمائید.

۶. اگر می بایست دارو را برای یک مدت طولانی مصرف کنید، برای بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.

۷. برای کاهش تحریکات گوارشی ناشی از این دارو، دارو را همراه با غذا مصرف کنید.

۸. در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت صرف نظر کرده مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید و مصرف دارو را طبق برنامه قبلی ادامه دهید.

۹. از مصرف همزمان این دارو با آنتی اسیدها خودداری کنید.

۱۰. این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

حساسیت به ایبوپروفن سابقه اسم کهیر یا واکنش های حساسیتی به آسپیرین یا سایر NSAIDs، در تسکین درد جراحی های CABG*.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود.

مقدار اندکی دارو در شیر ترشح می شود از این رو در مدت شیردهی مصرف این دارو توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

۱. اگر تحریکات گوارشی ناشی از مصرف این دارو (سو، هاضمه، تهوع، استفراغ، درد معده یا اسهال) ادامه یافت، پزشک معالج خود

را مطلع کنید.

۲. قبل از انجام هر گونه عمل جراحی یا دندانپزشکی، پزشک خود را از مصرف این دارو آگاه سازید.

۳. استفاده از دو یا چند داروی ضد التهاب غیر استروئیدی با یکدیگر ممکن است اثرات ناخواسته دارو را افزایش دهد. بنابراین آسپیرین و سایر سالیسیلات ها، سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و همچنین استامینوفن را همراه با این دارو برای بیشتر از چند روز مصرف نکنید.

۴. این دارو ممکن است در برخی از افراد سبب گیجی، خواب آلودگی، سبکی سر یا تاری دید شود و منجر به کاهش سطح هوشیاری گردد، لذا در طول مدت مصرف این دارو قبل از حصول اطمینان از چگونگی واکنش نسبت به آن، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، اجتناب کنید.

۵. برخی از افرادی که داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مصرف می کنند، ممکن است نسبت به نور خورشید حساس شوند لذا در طول مصرف این دارو از قرار گرفتن در مقابل نور مستقیم خورشید خودداری کنید و در صورت لزوم از کرم ضد آفتاب و لباس های کاملاً پوشیده استفاده نمایید.



ساخت شرکت داروسازی اکسیر – ایران

References:

1. USP DI, Advice for the patient Drug information in lay language, 2007 (27th edition), volume 1, pages: 164-174
2. Lexicomp drug information hand book, 2015 (23rd edition), pages: 1047-1048

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:

تلفن گویا: ۰۶۶-۴۲۶۰۰۰۲۲

ایمیل: exir_cc@exir.co.ir

وب سایت: www.exir.co.ir

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۷۴۸۳۷

تلفن گویا:

ایمیل:

وب سایت:

سامانه پیامکی:

