

بیوتین

برینت®

Biotin
Brient®

مشخصات دارو:
آمپول برینت® تولیدی شرکت داروسازی اکسیر حاوی ۵ میلی گرم بیوتین (ویتامین ب_۷)، به عنوان ماده مؤثره در یک میلی لیتر فلزی باشد که در بسته بندی های ۵ عددی همراه با برگه راهنمایی به بازار عرضه می گردد.

دسته دارویی:^(۱)
ویتامین محلول در آب

موارد مصرف:^(۱)
درمان کمبود ویتامین ب_۷: کمک به سلامت پوست، مو و ناخن، بالابردن سطح انرژی، کمک به کنترل قند خون در افراد دیابتی.

راهنمایی های عمومی:^(۲)
این دارو برای بیماران فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.
از مصرف نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید.
در صورت حساسیت به هریک از اجزا فرآورده پزشک خود را مطلع سازید.

موارد منع مصرف:^(۱)
در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو یا اجزا، فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:^(۲)
مصرف این دارو در دوران بارداری جز با توصیه پزشک محاج نمی باشد.
مصرف این دارو در دوران شیردهی جز در موارد ضروری و طبق نظر پزشک توصیه نمی شود. در مورد مصرف یا تغییر دوز دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخلات دارویی:^(۲)
آنچه بیوتینیک ها: مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها ممکن است سطح بیوتین را به علت از بین بردن باکتری های تولید کننده بیوتین در روده کاهش دهد.
داروهای ضد صرع: مصرف طولانی مدت داروهای ضد صرع مقدار بیوتین را در بدن کاهش می دهدن. مصرف والپروکسیک اسید منجر به ایجاد کمبود بیوتینیداران می شود. سایر داروهای ضد صرع شامل کاربامازین، فنواتریبتال، فنی توئین و پریمیدون می باشد.
در صورت استفاده از سایر داروها حتی پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید.

هشدارها و موارد احتیاط:^(۲)
این دارو را ببیشتر از دوز توصیه شده مصرف نکنید.
استفاده طولانی مدت با دوزهای بالا ممکن است باعث بروز واکنش های حساسیتی شود.
تزریق وریدی این دارو توصیه نمی شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:^{(۱)(۲)}
مقدار و نحوه مصرف دارو توسط پزشک مشخص می شود اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:
مقدار نیاز روزانه:
نوزادان ۱ تا ۶ ماه ۵ میکروگرم روزانه، برای شیرخواران ۷ تا ۱۳ ماه ۶ میکروگرم روزانه، برای کودکان و نوجوانان ۸ تا ۲۵ میکروگرم (۰.۷ mg/kg/day) روزانه با نوجه به سن مورد نیاز می باشد.
در افراد بزرگسال ۳۰ میکروگرم روزانه مورد نیاز می باشد.

عوارض جانبی دارو:^(۲)
هر دارو به موارزات اثبات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه عوارض در یک

فرد دیده نمی شود در صورت بروز هر یک از عوارض ذیل با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
ناکنون با مصرف بیوتین، عوارض جانبی مهیّ گزارش نگذیده است.
التهاب پریکارد قلب و انوزبیوتوفیلیک حاد در مواردی مشاهده شده است.

مسومیت:

در صورت مصرف مضرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:^(۱)
دارو را در مکانی کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
فرآورده برای بیکار مصرف می باشد، باقیمانده دارو را پس از مصرف دور بریزید.
فرآورده بی رنگ، شفاف و عاری از ذره می باشد در غیر این صورت از مصرف دارو خودداری نمایید.

References:

1- Martindale the complete drug reference .edition 39. Page: 22087

2- Accessdata.fda.gov [online] Available at: <https://www.accessdata.fda.gov> [Accessed 21 May 2019], www.drug.com

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:
تلفن گویا:
ایمیل:
وب سایت:
۰۰۰۱۸۸۹۱۰۹۱۰
exir_cc@exir.co.ir
www.exir.co.ir

