

## مشخصات دارو:

کپسول کامپی فن® تولیدی شرکت داروسازی اکسیر حاوی ترکیبات ذیل در پلیسترهای ۱۰ عددی تهیه و به همراه برقه راهتا در جعبه‌های ۳۰ عددی (حاوی ۳ پلیستی به بازار عرضه می‌گردد.

## ترکیبات دارو:

استامینوفن، ۳۲۵ میلی گرم / ایبوپروفن، ۲۰۰ میلی گرم / کافئین، ۴۰ میلی گرم

## دسته دارویی:

ضد تب، ضد درد غیر اپیوئیدی و ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID)، تحریک کننده ی سیستم عصبی مرکزی، مهار کننده ی آنزیم فسفودی استراز.

## راهنمای های عمومی:

این دارو برای بیماری فُلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

۱. قبل از مصرف دارو مندرجات روی جعبه و دستورالعمل آن را مطالعه فرمائید، این کپسول حاوی ترکیب سه دارو می باشد و ممکن است یکی از آن ها با شرایط شما سازگار نبوده و دارای مضراتی باشد.
۲. جهت کاهش اختلالات گوارشی دارو را با غذا و همراه یک لیوان آب یا شیر بعد از غذا مصرف نمایند.
۳. مصرف الکل همراه این داروها خطرناک بوده و می‌تواند عوارض جانبی را تشدید کند.
۴. از مصرف بیش از مقدار مجاز در طول شبانه روز خودداری نمایید.
۵. مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن و ایبوپروفن می‌تواند خطرناک باشد و بیمار را در معرض مقدار بیش از حد مجاز این داروها قرار دهد، در این شرایط خطر مسموم به کبد و کلیه وجود دارد.
۶. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:
۷. مصرف این دارو در بیماران مبتلا به هر گونه نارسایی قلبی، آسم، نقص عملکرد کبد و کلیه باید با احتیاط و به دستور پزشک باشد.

- در صورتیکه بیمار کودک و فرد مسن باشد.

- در دوران بارداری و شیردهی.

## موارد منع مصرف:

- در صورت وجود هر گونه سابقه حساسیت به ترکیبات دارو: استامینوفن، ایبوپروفن و کافئین و یا سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) و آسپرین.
- در دوران بارداری به ویژه ۳ ماهه ی سوم.
- در صورت ابتلا به هر گونه نارسایی قلبی، کلیوی و کبدی، آسم و کبیر.
- در صورت استفاده بدون نسخه، از مصرف سایر داروهای که حاوی استامینوفن و ایبوپروفن می باشند خودداری نمایند، چنان هم علت وجود ایبوپروفن در ترکیبات دارو از مصرف آن قبل و بعد از جراحی های قلب خودداری نمایند.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

با توجه به عبور دارو از جفت و خطرناک بودن مصرف مسکن‌های ضدالتهاب غیر استروئیدی در دوران بارداری و هم چنین به علت ترشح دارو در شیر، مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی فقط با تجویز پزشک مجاز می باشد.

## هشدارها و موارد احتیاط:

در زمان مصرف این دارو رعایت نکات زیر توصیه می شود:  
دارو را بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید.  
در بیماران دارای مشکلات گوارشی نظیر: زخم معده، خونریزی معده (به علت کاهش خواص پلاکت)، رفلاکس و کرون و بیماران با سابقه نارسایی کبدی و کلیوی، سرخ، اختلالات قلبی-عروقی، فشارخون بالا، ادم و سوء تغذیه و آسم (خصوصاً در بیماران که مبتلا به آسم حساس به اسپرین می باشند به علت احتمال بالای ایجاد بروکواسپاسم) با احتیاط و با تجویز پزشک مصرف شود.  
مصرف این دارو در بیماران مبتلا به اضطراب و بی قراری، لرزش، آریتمی قلبی و بیمارانی که تحت جراحی قلب قرار گرفته اند توصیه نمی شود.

در بیماران دچار نقص آنزیم G6PD (فاویسم) با احتیاط مصرف شود.

با توجه به وجود کافئین در ترکیبات دارو از مصرف نوشیدنی ها و خوراکی های حاوی کافئین خودداری شود.

ماتریم مقدار مصرف استامینوفن در بزرگسالان، روزانه ۴ گرم می باشد و مصرف بیشتر از دوز مجاز و یا مصرف طولانی مدت دوز معمول دارو، ممکن است باعث ایجاد آسیب کبدی گردد، لذا از مصرف طولانی مدت این دارو خودداری

نمایند و در صورت بر طرف نشدن علائم بیماری حتماً با پزشک خود مشورت نمایند.

احتیاط بروز واکنش های حساسیتی وجود دارد. در صورت مشاهده اولین علائم مصرف دارو را قطع کنید.

## تداخلات دارویی:

- مصرف همزمان این دارو با برخی داروها تداخل دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است: کتورولاک (نازال و سیستمیک)، ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) نظیر دیکلوفناک، مهارکننده های گیرنده ی COX-2 نظیر سلکوکسیب.

- در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک و یا داروساز خود را مطلع سازید.

## مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه صحیح مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند؛ اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

مقدار مصرف در بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال: ۱ عدد برحسب نیاز، هر ۴ الی ۶ ساعت می باشد و مصرف بیش از این مقدار در طول شبانه روز بدون تجویز پزشک توصیه نمی شود.  
مصرف دارو در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود و در صورت نیاز حتماً با نظر پزشک صورت گیرد.

## عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همگی این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

واکنش‌های حساسیتی، اختلالات گوارشی نظیر گاستریت، تحریک مری و خونریزی گوارشی، اسهال، تهوع و استفراغ، اختلالات کلیوی، سمیت کبدی، آرتزین صدری، درد قفسه ی سینه، تپش قلب، آریتمی، تاکیکاردی و آنمی، ادم، وزوز گوش، بیبوست، خارش، راش و تنگی نفس، بی قراری، هذیان، توهم، خستگی، جنون، سرگیجه، سردرد، بی خوابی، تحریک پذیری، تکرار ادرار، افزایش فشار داخل چشم و تنگ شدن مردمک چشم.

## مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سبباً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

## شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته جداً خودداری نمایید.

## References:

1. Lexicomp Drug Information Handbook, 2017-2018, 26<sup>th</sup> edition, Pages: 1760-1763, 1765, 358, 1149-1156
2. BNF 74, 2018, Pages: 422, 1251
3. USPDI Drug Information for Health Care Professional, 2007 volume 1, Page: 683



فوت توپروفن کامپی فن

2205107/IR1

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت،  
تلفن گویا:  
۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰  
edr.cc@edr.co.ir  
ایمیل:  
وب سایت: