

## مشخصات دارو:

قرص اگزالد® شب و روز تولیدی شرکت داروسازی اکسیر، حاوی ترکیبات ذیل در بلیسترهای ۸ عددی که حاوی ۶ عدد قرص روز و ۲ عدد قرص شب می‌باشد، در جعبه‌های ۱۶ عددی (حاوی ۲ بلیست) همراه با برگ راهنمای به بازار عرضه می‌گردد.

قرص شب	قرص روز
استامینوفون ۳۵۵ میلی گرم	استامینوفون ۳۵۵ میلی گرم
فنیل افیرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم	فنیل افیرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم
دکستروموتوفران هیدروبروماید ۱۵ میلی گرم	دکستروموتوفران هیدروبروماید ۱۵ میلی گرم
کلرفنیدامین مالتات ۲ میلی گرم	کلرفنیدامین مالتات ۲ میلی گرم

## دسته دارو:

ضد درد، ضد احتقان، ضد سرفه و قرص شب دارای آنتی هیستامین نیز می‌باشد.

## وارد مصرف:

(قرص روز) برای تسکین علائم سرماخوردگی شامل؛ تب، سرددرد، سرفه، گلو درد و گرفتگی بینی به کار می‌رود. (قرص شب) برای تسکین علائم سرماخوردگی شامل؛ تب، سرددرد، سرفه، گلو درد، گرفتگی بینی، آبریزش بینی و بیزش شکم به کار می‌رود.

## راهنمایی های معروف:

این دارو ایمپری بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نماید.

## ۱. توصیه می‌شود در طول شباده‌روز، پیش از ۸ قرص مصرف نشود. به علاوه قبل از خوردن دارو، برگه راهنمای دارو را مطالعه نماید.

## ۲. دارو را با یک لیوان آب مصرف نماید و جبت کاهش مشکلات گوارشی، دارو را با غذا یا شیر مصرف نماید.

## ۳. قرص شب باعث گیجی و خواب آودگی می‌گردد لذا حين درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هشکشیاری گامی دارد خودداری نماید.

## ۴. صرف الکل همراه با این دارو خطرناک بوده و می‌تواند عوارض جانبی را تشدید نماید.

## ۵. دارو را طبق سنتور پیشک میل نماید. در میوتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کرده به محض

## به پاد آوردن، آن را مصرف نکند و در مصرف فرا رسیدن زمان مصرف دوز بعدی، از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری نماید.

## ۶. صرف پیش از یک هفته این دارو توصیه نمی‌شود.

## وارد مصنوع:

- در صورت وجود هر گونه نارسایی کلیوی و کبدی

- در صورت مصرف پیشک بدون نسخه، از مصرف سایر داروهایی که حاوی استامینوفون و یا سایر آنتی هیستامین‌ها می‌باشند خودداری نماید.

- از مصرف همراهان با داروهای مهارکننده ای آنتی مونوآمین اکسیداز خودداری نماید. بعد از ۱۶ روز قطع مصرف مهارکننده های مونوآمین اکسیداز مصرف این دارو بلامانع است.

## صرف در دوران بارداری و هشیاری:

با توجه به عبور دارو از درشیر، مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی فقط با تجویز پیشک مجاز می‌باشد.

## هشدارها و موارد احتیاط:

در زمان مصرف این دارو رعایت نکات زیر توصیه می‌شود:

دارو را بیش از مقدار توصیه شده توسط پیشک مصرف نکنید.

هدنگام مصرف این دارو به کاهش راشماتیز باقی و افزایش مشکلات دهان و دندان، کاملاً بهداشت دهان و دندان را رعایت نکنید.

مصرف استامینوفون باعث آسیب و نارسایی کبدی می‌شود، لذا مصرف همراهان این دارو با استامینوفون،

بیمار را در مععرض مقدار زیادی استامینوفون قرار می‌دهد و می‌تواند احتقام عصبی به کبد و کلیه را افزایش دهد.  
مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی‌های کبدی و کلیوی با احتیاط و با نظر پزشک باشد.  
- در صورت وجود هرگونه سایده حساسیت نسبت به ترکیبات دارو، آسپرین، فنیل افیرین یا سولفیت‌ها، کلرفنیدامین یا سایر آنتی هیستامین‌ها

- در صورت این دارو به اختلالات سیستم عصبی، با توجه به اثر دارو بر روی سیستم عصبی مرکزی  
- در صورت این دارو به نوع بیماری به خصوص بیماری قلبی-عروقی، دیابت، رژم مده به روزه داشت، فشار خون بالا، پرکاری تیره‌گرد و بزرگ خوش قیم پرسنات، گلوكوم (آب سیاه)، برونشیت و آسم  
- در صورت مصرف داروهای اسید: آنتی کلرینزیکها مانند حی سیکلومین، اکسی بوتین و سولفیت‌اسین، داروهای افزایش دهنده فشارخون، سرکوب کننده‌ها با مرکزی‌های سیستم عصبی مرکزی  
- در صورت این دارو به این داروهای ذیل را برشد:  
- در بیماران دارای سو، تغذیه و بیماران با نقص آنژیPD \* (فایویسم)

## تحذیفات دارو:

از مصرف همراهان این دارو با داروهای ذیل خودداری نماید:  
اسپری بینی آرالستین، مشکلات ارکوت، هیالورونید، داروهای مهارکننده ای آنتی مونوآمین اکسیداز، گلوكاتون، گلکوبیرونات و اپیراتروپیوم (فرم استنشافی)، دیتروگلیسیرین، اورفاندرين، پاتسیم کلارید، تایلدوماید، بوتیروپویم.

در صورت استفاده از سایر داروهای حتی داروسازی و یا پیشک خود را مطلع سازید.

## مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف در بیکسالان و کودکان بالای ۱۲ سال: ۱ الی ۲ عدد قرص برجسب نیاز، هر ۶ ساعت می‌باشد و این مقدار نایابی بیشتر از ۸ قرص در شبیانه روز گردد. مقادیر فوق در هنگام فعالیت روزانه از قرص های روز (سقید رنگ) و در هنگام خواب از قریض های شب (آبی رنگ) استفاده گردد.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به تزدیکترین مركز اوزراس مراجعه نماید.

## عواقب جانبی دارو:

هر دارو به هوازیات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه‌ی این عوارض در بیک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یکی از عوارض زیر را پیشک خود مصرف نماید: واکنش‌های حساسیتی، خشکی دهان، لرزش، اختلالات خونی، پریان، مشکلات گوارشی یا خونریزی دستگاه گوارش، اختلالات کلیوی، سمعت کبدی، کلیچ، افزایش فشارخون، افزایش دهان چشم، تاری دید، بی قرایی، سرددرد، اسپا و پیوست، بی اشتیابی، تهوع، استفراغ، درد، یا کراپ مده و افزایش غیرعادی تعریق و احتیاط ادراری.

## مسوومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پیشک و یا مراکز درمانی مراجعه نماید.

## شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

در میان: که مدت از درجه سانتی گراد، در از نور و رطوبت نگهداری نماید.  
دارو را در از نور و رطوبت نگهداری نماید.  
از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته جد خودداری نماید.

\*: Glucose - 6 - Phosphate Dehydrogenase

## References:

1. Lexicomp Drug Information Handbook, 2017-2018, 26<sup>th</sup> edition, Pages: 1760-1768, 1828
2. Drug facts and comparisons, 2015, Pages: 1411-1412, 1211, 1244, 1228-1229



راه های تهاب ماس با شرکت ار اند هر گونه پیشنهادها را شکایت:  
تلن: گویا:  
ایمیل:  
 وب سایت:  
۰۱۱-۸۸۹۱۰۹۱۰  
exir\_cc@exir.co.ir  
www.exir.co.ir