

اکسیلامر® ۸۰۰

سوالامر کربنات

Exilamer® 800

Sevelamer Carbonate

مشخصات دارو:

اکسیلامر® شرکت داروسازی اکسپیر شامل قرص های روکش دار حاوی ۸۰۰ میلی گرم سوالامر کربنات می باشد که در
بطری ۱۸۰ ساعت دهدی همراه با بزرگراهنمایی بازار عرضه می گردد.

دسته دارو:

رسانهای غذایی معمولی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا نومیه آن به دیگران جداً
خودداری نکنید.

قبل از مصرف دارو در غصه های پوشیده ریز یا پیشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

در صورت بارداری یا تضییغ بیماری:

در صورت مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

در هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:
- جهت اطلاع از دارو به غذا مصرف معاچ خود در ارتباط باشید.
- دارو را همراه با غذا مصرف فرمایید.

در صورت مصرف داروهای نظر داروهای آنتی آریتمی، ضدمرمع و سپیروفلاکسایسین، این داروها را ۱ ساعت قبل و

۳ ساعت بعد از مصرف سوالامر مصرف ننمایید.

موارد منع مصرف:

- حساسیت به اکسیلامر® یا سایر اجزا فرآورده، بیماری انسداد روده (۲) و هیپوفسفاتمی (۳).

مصرف در دوران بارداری و شیرده:

مصرف در دوران بارداری در رده C فارار دارد (۴)، و تجویز این دارو بر زیان احتمالی آن بر جنین برتری داشته با توجه به نظر پیشک
به آن کاملًا حصر شده و فواید حاصله به طور کامل بر زیان احتمالی آن بر جنین برتری داشته با توجه به نظر پیشک
مجاز نیست.

- سوالامر جذب سیستیک نمی شود اما آنچه که ماده از جذب ویتابین ها در شیر مادر می گردد مصرف آن در دوران
شیردهی باید تحت نظر پیشک مصالح صورت گیرد.

هندوزها و مواد احتیاط:

- قرص را کامل بپیش بینی، از خرد کدن و خوبین آن خودداری نکنید.
- اینچی این دارو در بیماران مبتلا به اختلال در بیان اختلال شدید سستگاه کوارشی از جمله بیوست شدید و یا جراحی
های لوحه کواش به اثبات نرسیده است لذا در این بیماران مصرف دارو بایست با تجویز پیشک مخصوص و با
احتیاط صورت گیرد.

- اینچی این دارو در افراد زیر ۱۸ سال به اثبات نرسیده است.

- در هنگام درمان با این دارو پایش میزان کلسیم، پیکرینات، کلراید و فسفر سرم نومیه می شود.

در بیماران حاصل شود:

- اطیبان غذایی به دلیل امکان کاهش جذب ویتابین های محلول در چربی نظری E, K و بیز کاهش جذب فولیک
- تداخلات غذایی: اسید لدا مصرف مکمل های حاوی این ویتابین ها پوره دار بیماران تحت دیالیز همراه با غذا نوشیه می شود.

دخلافات دارو:

مصرف همراهان این دارو با داروهای ذیل تداخل دارد و حتی قبیل از مصرف داروساز یا پیشک خود را مطلع سازید:
- کلسی تریو، لوتویریکسین، مایکروفوتول، آنتی بیوتیک های کینتولون، سپیروفلاکسایسین، داروهای آنتی آریتمی و
ضد مرع، تاکرولیموس، فولیک اسید، سپیروفلاکسایسین، داروهای آنتی آریتمی و
در صورت استفاده از سایر داروهای حتما پیشک خود را مطلع سازید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار تعویض دارو بارهای تعبیین می کند: اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:
- دوز اولیه: ۸۰۰ میلی گرم مسی پار در روز همراه با هر وعده غذا.

- دوز نگهدارنده: بر حسب میزان فسفات خون در بزرگسالان، میزان سطح بدن در کودکان ۶ سال و پرترکت مقدار دوز
نگهدارنده به تواند تغییر کند و حداقل ۱۲ گرم روزانه.

عارض جانبی:

هر دارو به مواد اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این



2205093 / IRI

برندگان سازمانی

بر