

EXIPRAZOL® 20
Omeprazole

اکسی پرازول® ۲۰
اُمپرازول

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

۱- وجود هر نوع حساسیت به این دارو و همچنین حساسیت به غذاها، مواد محافظ و رنگها .
۲- در صورت مصرف داروهای دیگر و همچنین ابتدا به بیماریهایی نظیر نارسایی کبدی .

راهنماییهای عمومی:

۱- دارو را قبل از غذا و ترجیحاً صبح میل نمایید .
۲- جهت کاهش درد می‌توان از آنتی‌اسیدها همزمان با مصرف دارو استفاده نمود.
۳- کیسول را به طور کامل بلعیده از خوردن، جویدن و یا باز کردن آن خودداری نمایید .
۴- دوره درمان را کامل کنید.
۵- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض به یاد آوردن آن را میل کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف کنید. از دو برابر کردن مقدار آن خودداری کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی متحصراً با نظر پزشک متخصص می‌باشد.

هشدار:

دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف نمایید و در صورت عدم بهبودی و یا بدتر شدن، پزشک معالجتان را آگاه کنید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است:
بزرگسالان: روزانه یک کیسول.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، لیکن در صورت بروز مزاحمت هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.

عوارض غیر شایع دارو عبارتند از: درد شکم و قولنج، ضعیف، گیجی، سردرد، خواب‌آلودگی، خستگی غیرعادی، درد ناحیه سینه، سوزش قلب، یبوست، اسهال یا مدفوع آبکی، نفخ، تهوع و استفراغ، بیثورات جلدی، خارش.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده فوراً به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

۱- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
۲- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
۳- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

اکسیر
شرکت داروسازی اکسیر
بروجرد - اهواز

