

مشخصات دارو:

گاما ایمونکس ساخت شرکت داروسازی اکسیر به صورت ویال نیم میلی لیتری و سرینگ آماده تزریق حاوی ۱۰۰ میکروگرم (دو میلیون واحد بین المللی) اینترفرون گاما - ۱b دوترکیب انسانی می باشد و همراه یک برگ راهنمای به بازار عرضه می گردد.

^(۱) دسته دارویی: اینترفرون^(۲)

راهنمایی های عمومی:

ابن دارو برای درمان بهینه ای از اینترفرون گاما میتواند خوبی پیشک، پرستاریا عضوی از خانواده که آموخت دیده باشد تزریق شود.

قبل ازصرف این دارو برای ایندازه عوارض شبه آنفولانزا (flu-like) قابل از تزریق دارو است اما تجویز شود و یا

همنین دارو در زمان خوب تزریق شود.

ایمنی و اریغنش اینترفرون گاما در دوزهای بیشتر از دوز پیشنهاد شده (۵۰ mcg/m²) ثابت نشده است. اگر واکنش های شدید حساسیتی رخ دهد باید دوز تجویزی باید ۵% کاهش باشد. با درمان از زمان این بین عوارض جانبی قطع شود.^(۳)

عوارض جانبی:

هر دارو به مواد افزایش مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از عوارض تاخوخته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک قدر بدین ترتیب شود در موروث دارویی عوارض تیربا پیشک می باشد و این دارو میتواند خود مشورت نماید.

عوارض جانبی بر اساس دوز mcg/m²، سه بار در هفتگه برای درمان گارانولوماتوز مزمن:

- سیستم ایمنی پارکتی: سرخرد، بی ارز، افسردگی

- پوستی: راش یا پوستی و معمضین قرآنی، نورم و درد در محل تزریق

- دستگاه گوارشی: دردهای شکمک، تبوغ، اسپال، استفراغ،

- ماهیچه ای: اسکلت، درد و نصف عضلانی آرتوپلیت، کمر در.^(۴)

مشویست:

در صورت مصرف اتفاقی پیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پیشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.

هزایندگاری و توبیه های عمومی:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگذاری نمایید.

- از مصرف و نگذاری دروغهای تاریخ گشته خودداری کنید.

- این فرآورده فقط ماده نگذارده می باشد. بعد از این باز شدن تمام محصولات داخل و پال باید فوراً استفاده گردد و قسمت استفاده شده دور ریخته شود.

- در صورت وجود ذره و یا غصه رنگ از مصرف دارو خودداری شود.

- دارو را دریچه (دهانی ۲-۸ درجه سانتی گراد) دور از زنگی نگذاری کنید.

- این دارو در مسوزی که مجموعاً پیش از ۱۲ ساعت فارغ از پیچال نگذاری شود قابل مصرف نمی باشد.

- از تکان دادن شدید و پال ها احتیاط کنید.

- قبل از هر گونه تعاس با دارو دست ها را کاملاً با آب و صابون شسته و خنثی نمایید.

- کودکان: دوز پیشنهادی اینترفرون گاما برای درمان بیماران مبتلا به گارانولوماتوز مزمن، پوکی استخوان بدخیم حاد، در کودکان و نوزادان که سطح بدن آن ها بیشتر از ۱۰٪ (معدول امیلیون واحد)، زیر جلدی، سه بار در هفته و بیماران که سطح بدن آن ها بیشتر از ۱۰٪ مترمیع است: 50 mcg/kg/dose (۵۰ میکروگرم/کیلوگرم).

نحوه صرف: حجم واقعی تعیین شده قابل از تزریق باید کنبل شود. تزریق یا باید سه بار در هفتگه شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و به صورت نیز جمل انجام شود. مناطق ایده آل بدن برای تزریق، احیله دالوپرد راست و چپ و کدام ران فی باشد. اینترفرون گاما میتواند خوبی پیشک، پرستاریا عضوی از خانواده که آموخت دیده باشد تزریق شود.

پیشنهاد می شود برای کاهش عوارض شبه آنفولانزا (flu-like) قابل از تزریق دارو است اما تجویز شود و یا

همنین دارو در زمان خوب تزریق شود.

ایمنی و اریغنش اینترفرون گاما در دوزهای بیشتر از دوز پیشنهاد شده (۵۰ mcg/m²) ثابت نشده است. اگر واکنش های شدید حساسیتی رخ دهد باید دوز تجویزی باید ۵% کاهش باشد. با درمان از زمان این بین عوارض جانبی قطع شود.^(۵)

عوارض جانبی:

هر دارو به مواد افزایش مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از عوارض تاخوخته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک قدر بدین ترتیب شود در موروث دارویی عوارض تیربا پیشک می باشد و این دارو میتواند خود مشورت نماید.

عوارض جانبی بر اساس دوز mcg/m²، سه بار در هفتگه برای درمان گارانولوماتوز مزمن:

- سیستم ایمنی پارکتی: سرخرد، بی ارز، افسردگی

- پوستی: راش یا پوستی و معمضین قرآنی، نورم و درد در محل تزریق

- دستگاه گوارشی: دردهای شکمک، تبوغ، اسپال، استفراغ،

- ماهیچه ای: اسکلت، درد و نصف عضلانی آرتوپلیت، کمر در.^(۶)

مشویست:

در صورت مصرف اتفاقی پیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پیشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید.

هزایندگاری و توبیه های عمومی:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگذاری نمایید.

- از مصرف و نگذاری دروغهای تاریخ گشته خودداری کنید.

- این فرآورده فقط ماده نگذارده می باشد. بعد از این باز شدن تمام محصولات داخل و پال باید فوراً استفاده گردد و قسمت استفاده شده دور ریخته شود.

- در صورت وجود ذره و یا غصه رنگ از مصرف دارو خودداری شود.

- دارو را دریچه (دهانی ۲-۸ درجه سانتی گراد) دور از زنگی نگذاری کنید.

- این دارو در مسوزی که مجموعاً پیش از ۱۲ ساعت فارغ از پیچال نگذاری شود قابل مصرف نمی باشد.

- از تکان دادن شدید و پال ها احتیاط کنید.

- قبل از هر گونه تعاس با دارو دست ها را کاملاً با آب و صابون شسته و خنثی نمایید.

References:

1- Drug facts and comparisons, 2015, Pages: 3064- 3065

2- Lexicomp Drug Information, 2017-2018, 26th edition, Pages: 1232- 1233

راه های تعاس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهادهای شکلیست:
تلفن گویه:
ایمیل:
وب سایت:
۰۱۱-۸۸۹۱-۰۱۰
exir_co@exir.co.ir
www.exir.co.ir



گاما ایمونکس ساخت شرکت داروسازی اکسیر به صورت ویال نیم میلی لیتری و سرینگ آماده تزریق حاوی ۱۰۰ میکروگرم (دو میلیون واحد بین المللی) اینترفرون گاما - ۱b دوترکیب انسانی می باشد و همراه یک برگ راهنمای به بازار عرضه می گردد.

^(۷) دسته دارویی: اینترفرون^(۸)

راهنمایی های عمومی:

ابن دارو برای درمان بیماری طعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

قبل ازصرف این دارو برای ایندازه عوارض شبه آنفولانزا (flu-like) قابل از تزریق دارو شود و یا

در صورت حساسیت به این دارو یا سایر اجزا موجود در فرمولاسیون.

در صورت حساسیت به سایر فاروده های مشتق شده از coli E. ^(۹)

صرف در بازداری و شیردهن:

صرف این دارو در دوان بازداری در گروه C قرار دارد و تجویز این دارو در فرد بازدار فقط در شرایط خاص که نیاز به آن کاملاً بحرث شده و قواید اصله به طور کامل برایان اعتمادی آن بر جنین بترتیب داشته با توجه به نظر پیشک مجاز هاست.

پیشک صورت پرکرد.

هدافها و موارد احتیاط:

- اینترفرون گاما در بیماران با سایه های مشکلات قلبی شامل علیم ایسکمی، داروسایی احتقانی قلب و آریتمی باید با احتیاط مصرف نمود.

- هنگام درمان بیماران با مشخصات خانگه دستگاه حملکرد دستگاه عصبی مركب نیز باید با احتیاط مصرف شود.

- افزایش مفعول دارو در بیماران با اختلالات کبدی و گلوبل و چربی خود را می بینند و پس از این دارو شده است که در این کوکان درمان بازداری مسوزی که مخفی استخوانی که بکار گیری مصرف شود، زیرا ممکن است هنگام مصرف این دارو دچار نتوپریوپنی و مرمومیت پیوپنی برگشت پذیر شدید و با احتیاط مصرف شود، در بیماران باش شود.

- در بیماران با مشکل سرکوب های غضروفی احتیاط مصرف شود، و با استنایع این دارو خود را می بینند.

- احتیاط مزدوج دارو در بیماران با دستگاه های احتیاطی کبدی باید به مراتب مهیا شود.

- راش های موضعی گذاشتراست از بیماران به دنبال تزریق اتفاق افتاده است که در بrix موارد حیا به قطع

درمان می باشد.

- قبل از شروع درمان و در حین درمان هر سه ماه یک بار باید CBC، BUN، کراتیتین،

الکترولایتها، آرایزیت ادرار و LFT (به صورت ماهانه در کوکان که باز ایکسال پاکش شود).

- از آنجایی که اینترفرون گاما ممکن است با اینترفرون گاما پاکش نیست، شرط احتیاط آن است که بیماران به صورت دوره ای از نظر وجود آنتی باید ضد اینترفرون گاما پاکش شوند.^(۱۰)

دادهات داروا:

- حتی الامکان از مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای سرکوب کننده مفعز استخوان پرهیز کنید.

- این دارو ممکن است باعث کاهش سطح سیتوکروم P450 شود در نتیجه باعث تغییر در متابولیسم داروهایی می شود که توسط این دارو متابولیزه خواهد شد.^(۱۱)

در صورت مصرف سایر داروهای خاص پیشک و یا داروساز خود را مطلع سازید.

قدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار و نحوه مصرف هم زمان این دارو با سایر داروهای سرکوب کننده مفعز استخوان پرهیز کنید.

- بزرگسالان:

- دوز پیشنهادی اینترفرون گاما برای درمان بیماران مبتلا به گارانولوماتوز مزمن، پوکی استخوان بدخیم حاد، 50 mcg/m^2