

سه مرتبه در هفته با فاصله‌ی ۴۸ ساعت بین تزریق‌های متواتر.
نحوه تزریق دارو:

تزریق نمودن در نواحی بازو، شکم، هیپ یا ران صورت بگیرد و برای کاهش احتمال وقوع آنروزی یافتد.
چریزیک قیل از تزریق را به متنظر هم داشتن با محیط، در دمای محیط قرار دهد.
دارو را دقیقاً قیل از تزریق به متنظر هم داشتن با محیط، در دمای محیط قرار دهد.
با قیامنده دارو را پس از تزریق دور بزنید.
از تزریق وریدی دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی دارویی:^(۱)

هر دارو به مواراث افراد درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه‌ی این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز بعضی از عوارض زیر با پیشکاری داروساز شفوت نمایید.
اضطراب، درد عضلانی، ضنه، درد کمر، درد قفسه‌ی سینه، بیوسیت، افسردگی، سو، هاضمه، تنگی نفس (ممکن است چند دقیقه بعد از تزریق رخ دهد)، گرفتگی، سردرد، راش، تبوع، واکنش‌های حساسیتی و واکنش‌های محل تزریق، عالم شبه آنفلانزا، نفاذناپایی، ادم، تعریق، پیش قلب، سنتکس، تاکیکاری، لرزش.
در صورت بروز هرگونه عارضه دیگر که در این بروگه راهنمای ذکر شده است، موضوع را به پیشکار، داروساز یا مراکز درمانی اطلاع دهید.

مسوومیت:

در صورت مصرف اتفاقی پیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پیشکار و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
شرایط نگذاری و توصیه‌های عمومی:^(۲)

- دارو را در پیچال (دمای ۳-۸ درجه سانتیگراد) در بسته بندی اصلی، دور از نور نگذاری و از بخ زدگی محافظت شود.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگذاری نمایید.
- از معرف و نگذاری داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.
- هر سرینگ فقط چیز بیکار مصرف نباشد.
- قبل از تزریق، ظاهر فراورده را به دقت مشاهده کنید. در صورت تغییر رنگ، کدر شدن یا وجود ذرات از مصرف آن خودداری نمایید.

References:

1. Lexicomp Drug Information Handbook, 2017-2018, 26th edition , Pages: 1074-1076
2. BNF 74, 2018, Page: 801
3. Drug facts and comparisons, 2015, Page: 2997

مشخصات دارو:

سرینگ آمده تزریق گلاکسیر[®] تولیدی شرکت داروسازی اکسیر حاوی گلاتیرامر استاتس به عنوان ماده موثره در دوزهای ۲۰ و ۴۰ میلی گرم در یک میلی لیتر می‌باشد که در بسته بندی های ۳ و ۱۲ مددی به همراه برگ راهنمای به بازار عرضه می‌گردد.

دسته دارویی:^(۳)

تعديل کنندهٔ سیستم ایمنی

راهنمایی‌های عمومی

این دارو برای بیماران فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

- در صورت ابتلاء به بیماری‌های غفوی، تاراسیایی‌های قلبی، اختلالات سیستم عصبی و یا مبتلا به هرگونه تومور با پیشکار مصالح خود شفوت نمایید.^(۴)

- پس از تزریق این دارو ممکن است محل تزریق ملتب و دردناک گردد.^(۵)

- در هنگام تزریق این دارو ممکن است عالم: ضعف، اضطراب، راش و آنژن و سرگیجه بروز کند که در این صورت پیشکار مصالح خود را مطلع نمایید.^(۶)

موارد منع مصرف:^(۷)

در صورت وجود هر گونه سایده ساخته شده استات، مانیتوول.

صرف در دوران بارداری و شیردهی:^(۸)

به دلیل اتفاقات ناکامی، مصرف این دارو در دوران بارداری و حتی ۱ ماه قبل از بارداری می‌باشد با احتیاط

و با توجه به ظرف پیشکار مصروف نماید.

ترشح دارو در شیر به ظرف پیشکار مشخص نمی‌ست، مصرف آن در دوران شیردهی می‌باشد با احتیاط و با توجه به ظرف پیشکار مصروف گیرد.

هشدارها و اوارد احتیاطی:^(۹)

واکنش‌های سیستمیک فوری بعد از تزریق (ظیر: اضطراب، درد قفسه‌ی سینه، تپش قلب، انقباض عضلات

گلو، تنگی نفس، گرفتگی، کهکشان) در درمدم قابل توجه از بیماران رخ در دهد، اغلب خود محدود و گذرا

هم است. درد قفسه‌ی سینه ممکن است با واکنش‌های فوری بعد از تزریق رخ دهد، درد گذرا معمولاً پس از

چند دقیقه برطرف می‌شود و اغلب با سایر عالم مرتبط نیست. لبیتواروفی در محل تزریق در زمانهای مختلف

بعد از درمان (گاهی پس از چندین ماه) ممکن است رخ دهد و برای کاهش احتمال وقوع، به بیمار توصیه می‌شود تا تزریق را به پورهای مناسب انجام دهد و محل تزریق را برای بار تغییر دهد.

احتمال بروز واکنش‌های آنفیاکتوئید وجود دارد.

تحادهای داروهای جدی ممکن است رخ دهد که در این صورت دیاز به تنظیم دوز یا درمان جایگزین و

ماندیوریدی پیشتر می‌باشد.

دادهای دارویی:^(۱۰)

از مصرف هم زمان گلاتیرامر استات‌ها داروهای زیر خودداری نمایید:

و اکسننس (اینترزاپیکال)، ناتالیزومب، پیمکولیموس، تاکرولیموس (موضوعی)، توفارسیتینیب، و اکسن

های زنده

صرف داروهای زیر هم زمان با گلاتیرامر استات‌ها نیاز به تنظیم دوز و مشورت با پیشکار دارد.

فینگولیموس، لفونامید، دنوزوکوب، رفلومیاست، تراستوتوزومب، تست پوسیتی کوکسید، اکیناسه، و اکسن

های غیرفعال.

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پیشکار مصالح خود را مطلع سازید.

مقدار و نحوه صرف دارو:^(۱۱)

مقدار داروهای صريح هر دارو را پیشکار معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

ام اس (عدود کننده و فروکش کننده): تزریق زیر جلدی روزانه ۲۰ میلی گرم یکبار در روز و یا ۴۰ میلی گرم

*RRMS: Relapsing Remitting Multiple Sclerosis



2205083 / IR1