

مشخصات دارو:

هیوسین-ان-بوتیل بروماید تولیدی شرکت داروسازی اکسیر به دو صورت قرص و آمپول می باشد. قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید ۱۰ میلی گرم در بسته بندی های ۱۰۰ و ۳۰۰ عددی و آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید ۲۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر در بسته بندی ۱۰ عددی همراه با بروشور به بازار عرضه می گردد.

دسته دارویی:

آنتی کولینرژیک
راهنمای های عمومی:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود هر گونه سابقه حساسیت به دارو
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر: اختلال گوارشی مانند رفلاکس، اسهال، زخم گوارشی یا پیوست شدید، فشار بالا یا سابقه ی حمله ی قلبی اخیر، سابقه ی مشکلاتی نظیر هایپر تروفی انسدادی پروستات، گلوکوم (آب سیاه)، هایپر تیروئیدی، بیماری کبدی و کلیوی یا آسیب های عصبی
- در صورتیکه بیمار نوزاد، کودک و یا فرد مسن باشد.
- در صورت مصرف سایر داروها مانند داروهای آنتی کولینرژیک^(۱،۲)

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به scopolamine و ترکیباتی مانند بلادونا و دیگر ترکیبات دارو هر دو فرم خو راکی و تزریقی منع مصرف دارد.

فرم تزریقی:

- مصرف نوع تزریقی آن در کودکان ممنوع می باشد.
- تجویز فرم عملتی (IM) در بیماریانی که داروهای ضد انعقاد مصرف می کنند ممنوع می باشد.
- در بیماران مزمن ریهی (خصوصاً در مواردی که نیاز به تکرار تجویز می باشد)، خونریزی یا وضعیت قلبی عروقی ناپایدار حد، مشکلات قلبی مانند MI^۱، HF^۲، تاکیکاردی وابسته به مشکلات قلبی تیروئیدی، گلوکوم با زاویه پارک که درمان نشده است، بزرگی پروستات همراه با احتباس ادراری، مگاکولون، هایپر تروفی انسدادی پروستات، میاستنی گراویس و خشکی دهان (زروتوستویا) منع مصرف دارد.

فرم خو راکی:

- در افرادی که دچار ریفلکس و التهاب مری هستند، منع مصرف دارد.
- در افرادی که دچار انسداد گوارشی مانند آشلازی، گلوکوم با زاویه باز، میاستنی گراویس، بیماری خشکی دهان (زروتوستویا) هستند منع مصرف دارد.^(۱)
مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در رده C بارداری قرار دارد و تجویز این دارو در بارداری فقط در شرایط خاص که نیاز به آن کاملاً معزز شده و فواید حاصله به طور کامل بر زیان احتمالی آن بر جنین برتری داشته باشد با توجه به نظر پزشک مجاز می باشد. ترشح دارو در شیر بسیار ناچیز می باشد. مصرف آن در زنان شیرده می بایست با احتیاط صورت گیرد.^(۱)
هشدارها و موارد احتیاط:

- مصرف نوع تزریقی آن در کودکان ممنوع می باشد.
- کودکان نسبت به اثرات سمی این دارو حساس تر بوده و احتمال مسمومیت با آنتی کولینرژیک ها در اطفال بیشتر از دیگر گروه های سنی است. نوزادان و کودکان مبتلا به آسیب مغزی یا فلج اسپاستیک یا ضربه مغزی نسبت به دارو واکنش شدیدتری نشان می دهند.

- احتمال بروز اثرات مغزی و سمیت دارو در افراد مسن بیشتر می باشد و ممکن است سبب بروز گلوکوم زودرس غیر قابل تشخیص و اختلال حافظه شود.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خشکی دهان گردد، جهت کاهش خشکی دهان از آدامس یا آبنبات های بدون شکر می توان استفاده نمود و در صورت ادامه آن بیش از دو هفته به پزشک یا دندان پزشک مراجعه فرمائید زیرا به دلیل عوارض آنتی کولینرژیک در حین مصرف فرآورده و کاهش ترشح غدد بزاقی، دندان ها به مراقبت بیشتری به منظور جلوگیری از پوسیدگی نیاز دارند .

- این دارو ممکن است موجب سرگیجه یا خواب آلودگی گردد، لذا هنگام رانندگی و فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری دارند احتیاط نمایند.

- پس از تزریق این دارو ممکن است محل تزریق ملتهب گردد و نیز احساس سرگیجه بروز نماید، در این صورت در هنگام بلند شدن از وضعیت نشسته یا خوابیده احتیاط کنید.

- در صورت بروز حساسیت چشم ها به نور یا تاری دید احتیاط نمایید، این دارو باعث افزایش فشار چشم می شود. در

*Mycardial Infarction (MI)

**Heart Failure (HF)

صورت وقوع مشکلات بینایی و یا درد در ناحیه چشم مصرف دارو را قطع و پزشک را مطلع کنید.

- مصرف این دارو احتمال بروز حمله قلبی را افزایش می دهد، در صورتی که ضربان قلبی بیشتر از حد نرمال و یا سابقه ی بیماری قلبی عروقی دارید پزشک را مطلع نمایید. هنگام مصرف فرآورده، ورزش و فعالیت به هوای باید با احتیاط صورت پذیرد.

- مصرف فرم تزریقی آن در هایپر پلازی پروستات همراه با احتباس ادراری با احتیاط صورت بگیرد.^(۱)

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید. این دارو می تواند باعث افزایش اثر دیگر داروهای آنتی کولینرژیک شود.^(۱)

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو توسط پزشک مشخص می شود اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

- فرم تزریقی آن به صورت IM، SC و IV Slow با سرعت ۱ میلی لیتر در دقیقه، (۱ml/min) قابل تزریق می باشد که ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم تا ۳ بار در روز تزریق می گردد. ماکزیمم دوز مصرفی ۱۰۰ mg/day می باشد.
- فرم خو راکی دارو معمولاً به صورت ۱ یا ۲ قرص، ۳ نوبت در شبانه روز تجویز می شود. با این حال ممکن است پزشک تا ۴ نوبت در روز با توجه به نیاز و شرایط بیمار این دارو را تجویز نماید. ماکزیمم دوز مصرفی ۶ mg/day می باشد.
- در صورت فراموشی یک نوبت مصرف دارو، به محض به خاطر آوردن، آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف کرده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

- مصرف این دارو در کودکان زیر ۶ سال مجاز نمی باشد.

- در سالمندان نیاز به دوز کمتری است و ممکن است نیاز به تنظیم دوز باشد.^(۱،۲)

عوارض جانبی:
هر دو موافق اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض قلبی عروقی: تاکیکاردی، برادیکاردی
عوارض پوستی: خارش، قرمزی، خشکی پوست

سیستم غدیدی: کاهش مقدار شیر، احساس تشنگی، کاهش تعریق
سیستم گوارشی: خشکی دهان، احتباس ادرار، بیبوست، اسهال، تهوع

عوارض چشمی: تاری چشم، خشکی چشم، درد، گلوکوم، دو بینی، عفونت چشم، خارش، حساسیت به نور
سیستم تنفسی: خشکی بینی، تنگی نفس

در صورت بروز هرگونه عارضه دیگر که در این برگه راهنما ذکر نشده است، موضوع را به پزشک، داروساز یا مراکز درمانی اطلاع دهید.^(۱)

مسئومیت:
در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.^(۱)

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته جداً خودداری کنید.

فرم تزریقی:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- در صورتی که صرفاً بخشی از محتویات آمپول مورد استفاده قرار گرفت، مابقی دارو می بایست دور ریخته شود.

- قبل از تزریق، قلمبر فرآورده را به مدت مشاهده کنید. در صورت تغییر رنگ یا وجود ذرات آن مصرف آن خودداری کنید.
فرم خو راکی:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

Manufactured by: Exir Pharmaceutical Co, Borujerd, Iran

References:

1. Lexicomp Drug information handbook, 2016-2017, 25th edition, Pages: 1021-1022
2. BNF 73, 2017, page: 81



راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایات:
تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰
ایمیل: exir_oc@exir.co.ir
وب سایت: www.exir.co.ir



EXIR 97.09.10
W*L: 100*145
BLACK U
350 U