

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید .

**راهنماییهای عمومی :**

- ۱) قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید :
- در صورت سابقه حساسیت به آسپرین یا هر نوع دارو ، غذا و یا مواد دیگر .
- در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر .
- در صورت ابتلا به هر نوع بیماری (از قبیل آسم ، ناراحتی گوارشی و ...)

**مصرف در دوران بارداری و شیردهی :**

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود .  
**هشدارها :**

- تزریق این دارو در کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است .
- این دارو ممکن است سبب گیجی و تاری دید شود ، لذا تا حصول اطمینان از بروز این عوارض از رانندگی و دیگر فعالیتهایی که نیاز به هوشیاری بالایی دارد خودداری کنید .
- این فرآورده در درمان تب مورد مصرف ندارد .
- این فرآورده فقط در موارد حاد به عنوان شروع درمان ، در شرایطی که شکل خوراکی یا شیاف آن قبلی استفاده نیست ، مصرف می شود .
- این فرآورده فقط باید به صورت عضلانی تزریق شود (توصیه می شود به صورت عمیق در عضله سرینی تزریق گردد) .
- حتی المقدور از تزریق این دارو در غیر از مراکز درمانی خودداری کنید .
- پس از مصرف از قرار گرفتن در معرض نور شدید خورشید خودداری کنید .
- طی درمان در صورت احتیاج به مصرف داروهای دیگر با پزشک خود مشورت کنید .

**مقدار مصرف :**

بزرگسالان : به عنوان شروع درمان در موارد حاد ، به میزان ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم در روز (برای مدت محدود) بصورت عضلانی تجویز می شود .

**عوارض جانبی :**

هر دارو به موازات آثار درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود ، که لزوماً تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود . در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بیمار را سریعاً به نزدیکترین مرکز اورژانس منتقل کنید :

از حال رفتن ؛ تنفس سریع یا نامنظم ؛ ضربان سریع و نامنظم قلب (نبض سریع و

نامنظم)؛ ورم کبیر مانند در صورت، پلک ، دهان ، لب یا زبان؛ ورم یا پف کردگی پلک و دور چشم ؛ تنفس کوتاه و مشکل و خس خس سینه ؛ احساس گرفتگی در قفسه سینه .

در صورت بروز هر یک از موارد ذیل مصرف این دارو را قطع کرده فوراً به پزشک خود اطلاع دهید :

درد شکم یا معده ؛ مدفوع خونی یا قیری رنگ ؛ درد قفسه سینه ؛ تشنج ؛ تب با یا بدون لرز ؛ تهوع ؛ سوزش سر دل ؛ سوء هاضمه ؛ نقاط سرخ رنگ روی پوست ؛ زخم یا نقاط سفید روی لب یا دهان ؛ خلط خونی ؛ خون دماغ ؛ خونریزی یا کبودی غیر عادی ؛ استفراغ خونی ؛ ثورات جلدی . نیز هرگونه عارضه احتمالی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید .

**مسمومیت :**

(... و نشانه های احتمالی ، مسأله رایجی از) رخامی وحتی به مالتیایا شریجه ...  
در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر تجویز شده فوراً با پزشک خود تماس بگیرید .

**شرایط نگهداری و توصیه های عمومی :**

۱) دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .

۲) از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .

۳) در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم نگهداری شود، از یخ زدگی محافظت گردد .

۴) ...

۵) ...

۶) ...

۷) ...

۸) ...

۹) ...

۱۰) ...

۱۱) ...

۱۲) ...

۱۳) ...

۱۴) ...

۱۵) ...

۱۶) ...

۱۷) ...

