

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.

راهنماییهای عمومی

- ۱ - قبل از مصرف این دارو درباره موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
 - در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر داروی دیگر به ویژه سولفونامیدها (از قبیل کولتریموکسازول)، نیز در صورت هر نوع حساسیت دیگر از قبیل حساسیت به مواد غذایی، رنگها، مواد محافظ یا حیوانات.
 - در صورت مصرف داروهای زیر: واردنافیل^۱، دیگر داروهای مسدود کننده گیرنده α_1 آدرنرژیک از قبیل پرازوسین، ترازوسین، فنتول آمین، دکسازوسین، سایمتیدین، وارفارین^۲.
 - دارو را هر روز در زمان معین - حدود ۳۰ دقیقه بعد از یک وعده غذایی مشخص (مثلاً ۳۰ دقیقه بعد از ناهار) - مصرف کنید.
 - کپسول را بطور کامل ببلعید. از خرد کردن، جویدن یا باز کردن کپسول خودداری کنید، مگر اینکه پزشکتان دستور دیگری داده باشد.
 - برای حصول اطمینان از اثربخشی دارو، بطور منظم با پزشک خود در ارتباط باشید.
 - اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوری آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی رسیده بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر کرده و به مصرف دارو طبق روال گذشته ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار مصرف در نوبت بعدی خودداری کنید^۲.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در زنان مورد مصرف ندارد.

مقدار و نحوه مصرف:

- مقدار مصرف دارو برای هر بیمار توسط پزشک تعیین می شود و باید دقیقاً از آن پیروی کرد.
- در زیر تنها مقدار مصرف معمول این دارو آمده است:
- درمان بزرگ شدن خوش خیم پروستات (BPH):
- بزرگسالان: درمان با ۰/۴ میلیگرم یک بار در روز (حدود ۳۰ دقیقه پس از یک وعده غذایی مشخص) آغاز می شود. این مقدار ممکن است در صورت لزوم توسط پزشک پس از ۲ تا ۴ هفته تا ۰/۸ میلیگرم یک بار در روز افزایش داده شود.
- اگر درمان برای مدت چند روز قطع شود از سرگیری درمان باید با مقدار ۰/۴ میلیگرم در روز شروع شود^۲.

هشدارها:

- ۱ - مصرف این دارو ممکن است سبب گیجی، احساس سبکی سر یا از حال رفتن شود. احتمال بروز این عوارض مخصوصاً در هنگام برخاستن از وضعیت نشسته یا دراز کش بیشتر است. برخاستن به آرامی، به کاهش این عوارض کمک می کند. در صورت بروز عوارض فوق بلافاصله بنشینید یا هر از بکشید، پس از چند دقیقه به آرامی برخیزید.
- ۲ - از آنجا که این دارو در بعضی افراد باعث گیجی می شود قبل از حصول اطمینان از عدم بروز این عارضه، از رانندگی، کار با ماشین آلات یا انجام سایر فعالیت‌هایی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.
- ۳ - در صورت بروز نعوذ طولانی یا دردناک آلت تناسلی بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. این عارضه بسیار به ندرت اتفاق می افتد با این حال عدم درمان به موقع سبب ناتوانی جنسی دائم خواهد شد.

۴ - در صورت نیاز به انجام عمل جراحی آب مروارید، چشم پزشکی را از مصرف این دارو مطلع کنید. همچنین اگر در طی ۹ ماه گذشته این دارو را مصرف کرده اید به چشم پزشکی اطلاع دهید.

سمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر تجویز شده بلافاصله با مرکز فوریت‌های پزشکی تماس بگیرید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات آثار درمانی مطلوب ممکن است دارای عوارض جانبی نیز باشد که بعضی از این عوارض در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارند.

در صورت بروز پریاپیسم (نعوظ طولانی یا دردناک آلت تناسلی) که بسیار به ندرت ممکن است اتفاق بیفتد بلافاصله به پزشک مراجعه کنید^۲.

دسته دیگر عوارض جانبی معمولاً با مرور زمان مرتفع می شوند. درباره نحوه پیشگیری از بروز این عوارض یا تخفیف آنها می توان از پزشک یا داروساز راهنمایی گرفت. بهرحال در صورت تداوم یا غیر قابل تحمل بودن این عوارض به پزشک خود اطلاع دهید. این عوارض عبارتند از: انزال غیر عادی، کمر درد، اسهال، گیجی، سردرد، گرفتگی یا آبریزش بینی، ضعف غیر معمول، درد قفسه سینه، کاهش میل جنسی، بیخوابی، خواب آلودگی، از حال رفتن یا احساس سبکی سر بویژه هنگام برخاستن از وضعیت دراز کش یا نشسته، تهوع.

همچنین در صورت بروز هر عارضه احتمالی دیگر که در این برگه راهنما ذکر نشده به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در بسته بندی اصلی در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری کنید.
- از یخ زدن محافظت کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

اشکال دارویی:

تامسولوسین شرکت داروسازی اکسیر بصورت کپسولهای پیوسته رهش ۰/۴ میلیگرمی عرضه شده است.

References:

- 1) USP DI, Advice for the Patient 27th edition 2007, 1521 - 1522
- 2) USP DI Drug Information for the Health Care Professional 27th edition 2007, 2690 - 2692



2205571/IR1