

متپرولول

Metoprolol



مخففهای دارو:

قرمز خط دارو متپرولول تارتارات تولیدی شرکت داروسازی اکسیبر، در دوز ۵۰ میلی گرم تولید و در جعبه های ۳۵۰۰ میلی گرم روزانه عرضه می گردد.

دسته دارویی:

دارویی قلبی - عروقی (کاهش خون و درمان آنژین صدری)، بلکه اختیار گیرده ۱۰

ارجاعی های دارویی عرضه:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

قلب - از مصرف این دارو در موارد زیر با پیشک معالج خود مشورت نمایید:

در صورت پارادی و شیرینی

در صورت داشتن هرگونه بیماری قلبی - عروقی

دارو را همراه با غذا یا بالا فاصله بعد از غذا میل نمایید.

دارو را بدو نوشیدن فقط تکید.

موارد منع مصرف:

- حساسیت به متپرولول و یا سایر اجزاء فرمولاسیون

- حساسیت به سایر این باتاکرا

- در صورت ابتدا به باتاک قلبی درجه ۲ و ۳

مصرف در پارادی و شیرینی:

با توجه به این دبور از جفت مصرف آن در دوران بارداری تومیه نمی شود و در صورت نزوم فقط با توجه به نظر پیشک

جزایر نمایید.

با توجه به تنش دارو ازحتمال بروز عوارض جانبی در شیرخوار مصرف آن در دوران شیردهی تومیه نمی شود

و در صورت نزوم این دبور به نظر پیشک جزایر نمایید.

هشدارها و موارد احتیاط:

- در مواد میوه مصرف دارو باید با احتیاط و زیر نظر پیشک مصرف بگیرد:

در بیماران مبتلا به دیابت، پارکای تیروپینید، نارسایی کبدی، کاروسی و بیماری های اعصاب و روان

در صورت ابتدا و یا سایه ابتدا به بیماری های قلبی - عروقی نظیر سیندرم سپیوس و باتوک قلبی، افت فشارخون و یا

انسداد عروق شریانی

در بیماران مبتلا به باتاک حلقوی - بطی، احتلال علکرد گره سینیوس و احتلال در هدایت قلبی

- به متغیر پیشگیری از تنش بروز تاکیداری، افزایش اشارةخون و ایست قلب، قطع مصرف این دارو باید به صورت

حریزی و طی ۱ الی ۳ مقدار مصرف بگیرد و از قطع مصرف باتاک این دارو خودداری نمایید.

در بیماران با سایه آشفتگی توکسیس موکارد گردیده احتمال بیشتری در عرض بروز تاکیداری قرار دارد و

- مصرف این دارو باید قطع گردد.

- مصرف دارو ممکن است باعث تندیدگی با سریع در عالم نارسایی سیریات در بیماران مبتلا به بیماریهای اعصاب

محيطی (PVD) Peripheral Vascular Disease) و سندروم بیندگی گردید.

در بیماران مبتلا به آنژین پیزنتال از تجویز باتاکرا بدو تجویز آنکه آندرزدیک های باتاک دارو خودداری گردد.

کاهش باید و یا مصرف دارو باید قطع گردد.

در بیماران مبتلا به متوكسیس باید از مصرف باتاکها گردید و تجویز متپرولول (باتاک

انتخابی) (۱) باید با احتیاط و پاییش بیمار توسط پیشک مصرف بگیرد.

- باید از تجویز مقدار منانه این باتاکها از قطع مصرف دارو قابل از جراحت خودداری نمایید.

- ممکن است باعث بروز یا شدید بیماری پسپورازیس گردد.

- مصرف دارو ممکن است باعث تضعیف سیستم عصبی مرکزی و احتلال در فعالیت فیزیکی - ذهنی گردد، لذا انجام

فعالیت های که تیز به هوشیاری دارد (آنندز ایندکس و کار با مشین آلات) باید با احتیاط مصرف بگیرد.

- بیماران مصرف کننده متپرولول با سایه شوک آنافلکسیکس و واکنش های حساسیتی نسبت به آنژین حساسیت هستند.

- بیماران مسن بالای ۶۵ سال با احتمال بیشتر ممکن است دچار بردیکاری شوند و ممکن است کاهش دوز ضروری باشد.

دادخالت دارویی:

از مصرف همراهان متپرولول با داروهای نظریت متابولین و ریواستیگمین خودداری نمایید.

در صورت استفاده از سایر داروها حتی پیشک و یا داروساز خود را مطلع سازید.

مقدار و جوهر مصرف دارو باید توسط پیشک تعیین گردد؛ اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

۵ بزرگسالان:

- آنژین صدری: میلی گرم دو بار در روز، موز معمول، ۵۰ الی ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز، افزایش دوز

به صورت هفتگی ممکن است تا رسیدن به اثر مورد نظر در نظر گرفته شود. ماکزیم دوز: ۴۰۰ میلی گرم روزانه

فیریزالسیون: میلی گرم دو بار در روز، دوز موز: ۵۰ الی ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز.

- فشارخون بالا: میلی گرم دو بار در روز، دوز موز: ۵۰ الی ۱۰۰ میلی گرم روزانه به صورت مقسم در دو الی سه

دوز. افزایش دوز به صورت هفتگی ممکن است تا رسیدن به اثر مورد نظر در نظر گرفته شود. ماکزیم دوز: ۳۵۰ میلی گرم روزانه دوز معمول: ۵۰ الی ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز، دوز مهدف: ۵۰ الی ۱۰۰ میلی گرم روزانه

- آنژارکوس میکارد: ۲۵ الی ۵۰ میلی گرم دارو در روز، دوز مهدف: ۵۰ الی ۱۰۰ میلی گرم روزانه

و افزایش دوز هفتگی ممکن است تا رسیدن به اثر مورد نظر در نظر گرفته شود. ماکزیم دوز: ۳۵۰ میلی گرم روزانه

- نکد: تنش در گردن در بیماران با الامات نارسایی قلبی، کاهش بروز دهنان دلیل بیماران را برسی بالا بروز شوک کاربپروپنیک تبادی با متپرولول باشد.

۵ کبستان:

به دو بار در بیمارگاه شود. مصرف دارو در گنبدسان باید با احتیاط و پیشک فشارخون و اثر دارو بر

بیمار معرفت بگیرد و همچنین با در نظر گرفتن شروع درمان با مکتبین دوز ۵۰ کبدان:

مصرف دارو در کودکان و نوجوانان (کمتر از ۱۷ سال) توصیه نمی شود مگر با تجویز پیشک.

- بیماران کبدی و کلیوی: در بیماران کبدی و کلیوی نیاز به تنظیم دوز نمی باشد و این در بیماران کبدی با احتیاط

مصرف گردد.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به مواد اثربخش دارویی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه ی این عوارض

در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پیشک یا داروساز مشورت نمایید.

سیستم عصبی: باریکایاری، نارسایی کبدی، ایجاد اکسیس سوزنگی، خود عرق مغزی، لنگرگن، سرد شدن اندام های

انتهای، باتوک، ایجاد اکسیس سوزنگی، ایجاد اکسیس سوزنگی، تهیش قلب، گیجی، بی خوابی، احتلال در خواب، افسردگی، توهین، کاوش های

شباهده، راهنمایی موقت

تاثیرات پوستی: راش پوستی، خارش، حساسیت به نور، تندیدگی پسپورازیس

سیستم گرد: درودن بیز و متابولیسم: کاهش عمل جنسی، دیابت نایابیار

سیستم کوارش: پوست با اسباب، نفخ، اسناس سوزنگی و درد بعده، تبعو و استفراغ، خشکی دهان

سیستم عصبی: عضلانی و اسکلتی، درد عضلانی و اسکلتی

عوارض چشم و گوش: تاری دید و احتلال در بیابان، وزو گوش

سیستم تنفسی: رونکوآسپیسم، تندگی نفس، التهاب بینی، خس خش کردن

سایر: درجات ناگفانی

مسوپیت: در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار شده سریع به پیشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

هزارهای نکدگاری و توبیه های عرضه:

دارو را در دمای کمتر از ۳۶ درجه سانتی گراد، دور از نور و روبروی نکدگاری کنید.

از مصرف نکدگاری راهراهی تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.

دارو را دور از ستترس کودکان نکدگاری نمایید.

References:

1. Lexicomp Drug information handbook, 2017, 26th edition, Pages 1509-1512
2. Drug facts and comparisons 2015, volume 1, Pages: 866-867.



2205169/ ۱

راه های تعلص با شرکت و اراده هرگونه پیشنهاد یا شکایت:

تلفن: ۰۱۱-۰۹۱۸-۱۰۱۰۰۰۰

exir_cc@exir.co.ir

www.exir.co.ir

EXIR 98.11.27

W[®]: 100*145

287 C

185 C

60% of 169 C