

# رانیتیدین

## ranitidine

محول دارویی با سرم های نرمال سالان، دکستروز ۵٪ ، ۱٪ و رینگر جبت رقیق سازی و تزریق سازگار می باشد.  
ماکزیم رسمت تزریق ۱۰ میلی گرم بر دقیقه توسعه شده است.  
در تزریق عضلانی نیازی به رقیق سازی نمی باشد.<sup>(۱)</sup>  
مقادیر مصرف معمول این دارو به صورت زیر است:  
پیزش سالان:

• زخم دوازدهه، فرم خوارکی، ۱۵۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت و یا ۳۰۰ میلی گرم یکبار در روز هنگام خواب.

تزریق بلوس متابو با انفوزیون ۵ میلی گرم تزریق عضلانی هر ۸ ساعت.  
(ماکزیم دوز ۴۰۰ میلی گرم روزانه) دوز نگهدازنه به صورت عددی و همچنین آمپول حاوی ۵ میلی گرم رانیتیدین (به صورت هیدروکلرايد) در ۲ میلی لیتر به صورت ۱ عددی به همراه برگه راهنمایی باشد.

انفوزیون وریدی ۶/۷۵ میلی گرم در ساعت

• اثواب ازوغایت، فرم خوارکی، ۱۵۰ میلی گرم هر ۶ ساعت. دوز نگهدازنه: ۱۵۰ میلی گرم ۲ بار در روز

• رفلاکس معده (GERD): فرم خوارکی، ۱۵۰ میلی گرم ۲ بار در روز

• سوزش ناحیه معده و پیشگیری ازان، (بدون نیاز به نسخه)

• زخم معده فعال و خوش خشم، فرم خوارکی، ۱۵۰ میلی گرم ۲ بار در روز. دوز نگهدازنه: ۱۵۰ میلی گرم ۱ بار در روز (هنگام خواب)

• ترشح بیش از حد اسید معده:

فرم خوارکی، ۱۵۰ میلی گرم ۲ بار در روز. در بیماران باشد پلا ترشح اسید تا دوز ۶ گرم روزانه قابل مصرف می باشد.

انفوزیون وریدی ۶/۲۵ میلی گرم در ساعت

• سدروم زولینکر-الیسون:

دوز اولیه: انفوزیون وریدی ۱ میلی گرم به ازی هر کیلو گرم بعد از اخذناه گیری برون ده گاستریک اسید در ۴ ساعت در صورت بیش از Eq ۱۰ و با

علائم دار بودن بیمار می توان دوز را به ۱/۵ میلی گرم در ساعت و یا ۱۵ میلی گرم در ساعت افزایش داد.

• بیمارانی که دریافت فرم خوارکی نمی باشند:

۵ میلی گرم به صورت تزریق عضلانی هر ۸ ساعت و یا به صورت تزریق وریدی با انفوزیون وریدی ۱۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت (ماکزیم دوز ۴۰۰ میلی گرم روزانه) دوز نگهدازنه: انفوزیون وریدی ۶/۲۵ میلی گرم در ساعت

کودکان:

• زخم دوازدهه یا معده، فرم خوارکی، نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن، یکبار در روز (ماکزیم دوز ۳۵۰ میلی گرم روزانه)

دوز نگهدازنه: چیز پیشگیری از عود مجدد بیماری: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن، یکبار در روز (ماکزیم دوز نگهدازنه: ۱۵۰ میلی گرم روزانه)

فرم تزریق، نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن به صورت تزریق وریدی هر ۶ یا ۸ ساعت (ماکزیم دوز ۵۰ میلی گرم در هر دو زن)

دوز نوجوانان بالای ۱۶ سال معادل بزرگسالان باشد.

• رفلاکس معده، مرو: فرم خوارکی، نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۱۰ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن به صورت ۲ بار در روز. (ماکزیم دوز ۳۰۰ میلی گرم روزانه)

• بیمارانی که قادر به دریافت فرم خوارکی نمی باشند:

نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن، یکبار در روز (ماکزیم دوز نگهدازنه: ۱۵۰ میلی گرم روزانه)

فرم تزریق، نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن به صورت تزریق وریدی هر ۶ یا ۸ ساعت (ماکزیم دوز ۵۰ میلی گرم در هر دو زن)

دوز نوجوانان بالای ۱۶ سال معادل بزرگسالان باشد.

• رفلاکس معده، مرو: فرم خوارکی، نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۱۰ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن به صورت ۲ بار در روز. (ماکزیم دوز ۳۰۰ میلی گرم روزانه)

بیمارانی که قادر به دریافت فرم خوارکی نمی باشند:

نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن، یکبار در روز (ماکزیم دوز نگهدازنه: ۱۵۰ میلی گرم روزانه)

فرم تزریق، نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن به صورت تزریق وریدی هر ۶ یا ۸ ساعت (ماکزیم دوز ۵۰ میلی گرم در هر دو زن)

دوز نوجوانان بالای ۱۶ سال معادل بزرگسالان باشد.

• بیمارانی که قادر به دریافت فرم خوارکی نمی باشند:

نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن، یکبار در روز (ماکزیم دوز نگهدازنه: ۱۵۰ میلی گرم روزانه)

فرم تزریق، نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن به صورت تزریق وریدی هر ۶ یا ۸ ساعت (ماکزیم دوز ۵۰ میلی گرم در هر دو زن)

دوز نوجوانان بالای ۱۶ سال معادل بزرگسالان باشد.

• رفلاکس معده، مرو: فرم خوارکی، نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۱۰ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن به صورت ۲ بار در روز. (ماکزیم دوز ۳۰۰ میلی گرم روزانه)

بیمارانی که قادر به دریافت فرم خوارکی نمی باشند:

نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن، یکبار در روز (ماکزیم دوز نگهدازنه: ۱۵۰ میلی گرم روزانه)

فرم تزریق، نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال: ۲ تا ۴ میلی گرم در روز به ازی هر کیلوگرم وزن به صورت تزریق وریدی هر ۶ یا ۸ ساعت (ماکزیم دوز ۵۰ میلی گرم در هر دو زن)

دوز نوجوانان بالای ۱۶ سال معادل بزرگسالان باشد.

• سیستم گوارش: خارش، درد درناجده شکم، پاش، انتباخ، استفراغ اسپاک، نکوت، هپاتیت کولیستاتیک، التهاب هپاتیت، هماتوپویزی و آنکوکلری: اگر اتوایوسیستوم کخو ایستیک، گراووسایتیدی، زرد، هپاتیت کولیستاتیک، پانکراتیت، پیوست.

لکوبن، پان سایدوپین، ترموموپایوپین

• واکنش های ازوگایت: اتفاقیکس، اتیوپادم و سایر واکنش های حساستی (تب، خارش، بثورات پوستی، کبیر، سرفه، بروکواپسیام،...)

• سیستم اسکلتی: درد عضلانی و مفاصل

• عوارض مومنی: خارش (خصوصا در ناخیه تزریق)، آکپیس، ارتیتم و مولن فرم

• سیستم گوارش: درون بزیر، پورفیرین، افایزیک پروولکن سرم

• سیستم گوارش: خارش، درد درناجده شکم، پاش، انتباخ، استفراغ اسپاک، نکوت، هپاتیت کولیستاتیک، پیوست.

• هماتوپویزی و آنکوکلری: اگر اتوایوسیستوم کخو ایستیک، گراووسایتیدی، زرد، هپاتیت کولیستاتیک، التهاب هپاتیت،

دازون، پان سایدوپین، ترموموپایوپین

• واکنش های ازوگایت: اتفاقیکس، اتیوپادم و سایر واکنش های حساستی (تب، خارش، بثورات پوستی، کبیر، سرفه، بروکواپسیام،...)

• سیستم اسکلتی: درد عضلانی و مفاصل

• عوارض مومنی: درد در محل تزریق، ترموموپلیت

• سیستم گوارش: اتفاقیکی بیش از مقدار تومیه شده سریعاً به پیشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

فراروده خوارکی را دور از رطوبت نگهدازی و فروارده نگهدازی تزریقی را از یخ زدگی محافظت کنید.

از مصرف و نگهداری از رطوبت نگهدازی و فروارده نگهدازی تزریقی را از یخ زدگی محافظت کنید.

دارو را دور از سترس کودکان نگهدازی کنید.

فراروده تزریق شفاف، بی رنگ تا زرد کم رنگ است. در صورت مشاهده کدورت با تغییر رنگ از مصرف دارو خودداری نمایید.<sup>(۱)</sup>

هزاری تزریق: از های تیزی و بیماری تیزی مولتی ویتامین/میرال، وافارین، ارینکلین، نمک های آهن، مزالین تداخل دارد، در صورت استفاده از

سایر داروها یا سایر داروهای حننا پیشک و یا داروساز خود را مطلع سازید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

آماده سازی چه تزریق:

فرم تزریقی به صورت آسته و رینگر جبت رقیق سازی و عضلانی قابل تزریق باشد:

نگهداری بعد از رقیق سازی با ۲۰ میلی لیتر (در طول مدت حداقل ۵ دقیقه)، چه تزریق آهسته و رینگر محلول باید حداقل تا غلظت

۷/۵ میلی گرم در میلی لیتر را حلال مناسب رقیق شود.

انفوزیون وریدی پس از رقیق سازی با ۱۰۰ میلی لیتر در طول زمان ۱۵-۲۰ دقیقه، چه انفوزیون وریدی محلول باید حداقل تا غلظت ۵/۰ میلی گرم در میلی لیتر با حلal مناسب رقیق شود.

مشخصات دارو:

رانیتیدین ساخت شرکت داروسازی اکسیر به صورت قرم روکشدار حاوی ۱۵۰ میلی گرم رانیتیدین (به صورت هیدروکلرايد) در بسته های ۱۰۰ عددی و همچنین آمپول حاوی ۵ میلی گرم رانیتیدین (به صورت هیدروکلرايد) در ۲ میلی لیتر به صورت ۱ عددی به همراه برگه راهنمایی باشد.

عرضه دارای:

آنچه اسید آنتاگونیست گیرنده هیستامین H<sub>2</sub> را مهار می کند.

رانیتیدین های عمده:

این دارو درمانی مهار می کند:

قیل از مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.

در صورت مصرف این دارو با پیشک مهار خود را در میان زمان ۲۴ ساعت از همه مهار می کند.