

## مشخصات دارو:

سواژل® شرکت داروسازی اکسیر به صورت قرص ۸۰۰ میلی گرم در بطری ۱۸۰ عددی همراه با برگه راهنما به بازار عرضه می گردد.

## دسته دارویی:

فسفات بایندر<sup>(۹۱)</sup>

## راهنمای های عمومی:

قبل از مصرف دارو در خصوص موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- در صورت سابقه حساسیت به سولامر و یا سایر اجزا فرآورده
- در صورت بارداری و یا تصمیم به باردار شدن
- در صورت ابتلا به بیماری های گوارشی

در هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- دوره درمان را کامل کنید (حتی اگر طی دوره درمان احساس بهبود نمایید) و جهت اطلاع از روند درمان بیماری، به طور منظم با پزشک معالج خود در ارتباط باشید.<sup>(۹۱)</sup>

## موارد منع مصرف:

- حساسیت به سولامر و یا سایر اجزا فرآورده<sup>(۹۱)</sup>

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در رده C بارداری قرار دارد؛ لذا مصرف آن در دوران بارداری توصیه نمی شود.
- سولامر جذب سیستمیک نمی شود اما از آنجا که مانع از جذب ویتامین ها در شیر مادر می گردد مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.<sup>(۹۲)</sup>

## هشدارها و موارد احتیاط:

- دارو همراه با غذا میل شود.
- قرص را بطور کامل بلعیده، از خرد کردن و جویدن آن خودداری کنید.
- ایمنی و اثر بخشی این دارو در بیماران مبتلا به اختلال در بلع، اختلالات شدید دستگاه گوارشی از جمله پیوست شدید و یا جراحی های لوله گوارش به اثبات نرسیده است لذا در این بیماران مصرف دارو می بایست با تجویز پزشک متخصص و با احتیاط صورت گیرد.
- ایمنی و اثر بخشی دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.
- در هنگام درمان با این دارو پایش میزان کلسیم، بیکرینات و کلراید توصیه می شود.
- مصرف این دارو منجر به کاهش جذب ویتامین ها به ویژه ویتامین های D ، E ، K و نیز کاهش جذب فولیک اسید می شود. لذا مصرف مکمل های حاوی ویتامین توصیه می شود.<sup>(۹۱)</sup>

## تداخلات دارویی:

در صورت مصرف همزمان این دارو با هر یک از داروهای ذیل پزشک خود را مطلع سازید:  
کلسی تریول، لووتیروکسین، مایکوفنولات، آنتی بیوتیک های کینولون، سیپروفلوکساسین، داروهای آنتی آریتمی و ضد صرع<sup>(۹۱)</sup>

## مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند؛ اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:  
دوز اولیه: ۱۶۰۰ - ۸۰۰ میلی گرم سه بار در روز همراه با هر وعده غذا.

دوز نگهدارنده: در حسب میزان فسفات خون مقدار دوز نگهدارنده می تواند تغییر کند.<sup>(۹۱)</sup>

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازت اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

اسهال، یبوست، تهوع و استفراغ، سوز، هاضمه، سرخه، سردرد، افزایش فشار خون، کاهش فشار خون، عفونت، تورموزیس، هیپرکالمیا، اسیدوز متابولیک<sup>(۹۱)</sup>

## مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

## شرایط نگهداری دارو:

- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- پس از هر بار مصرف، در بطری را محکم ببندید.

## References:

- 1- Drug facts and comparisons, 2015, pages: 1096-1097
- 2-Lexicomp Drug information handbook, 2015, 23<sup>rd</sup> edition , Pages 1913-1914



شرکت داروسازی اکسیر  
سویس - ایران



2205043/1R1

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:  
تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰  
ایمیل: exir\_cc@exir-co.ir  
وب سایت: www.w.exir-co.ir