

تتراکوزاکتاید ال.آ.

TETRACOSACTIDE L.A.

این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری کنید.

دسته دارویی:

استروئید آدرنوکورتیکال^(۱)

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود هر گونه حساسیت به این دارو یا اجزاء فرآورده
- در صورت بارداری
- در صورت مصرف داروهای ضد فشارخون، ضد تشنج و ضدبارداری هنگام مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:
- در صورت ابتلا به دیابت، سطح قند خون را به صورت منظم پایش کنید. ممکن است به تنظیم و افزایش دوز انسولین و یا داروی خوراکی نیاز باشد.

- هم زمان با مصرف این دارو از انجام واکسیناسیون اجتناب کنید. واکسیناسیون در نزدیکان بیمار نیز با احتیاط انجام شود.
- در صورت مشاهده ی خون در مدفوع و یا تغییر رنگ مدفوع، پزشک خود را مطلع سازید.^(۱)
- این دارو می تواند باعث احتیاس آب و نمک در بدن شود؛ لذا در خصوص لزوم مصرف رژیم کم نمک با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت بروز سرگیجه یا تاری دید پس از استفاده از این دارو، از رانندگی و انجام فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری دارند اجتناب نمایید.

موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به تتراکوزاکتاید، ACTH
- در صورت ابتلا به آسم و یا سایر واکنش های حساسیتی
- در نوزادان نارس و نوزادان زیر یک ماه
- در افراد مبتلا به عفونت های درمان نشده ی باکتریایی، ویروسی و قارچی
- در بیماران مبتلا به سندرم کوشینگ
- در بیماران مبتلا به سایکوز حاد
- در بیماران مبتلا به نارسایی اولیه آدرنوکورتیکال^(۲)

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری در گروه C قرار دارد و مصرف آن توصیه نمی شود. در صورت نیاز و با توجه به ارزیابی فواید دارو نسبت به مضرات آن، تحت نظر پزشک مصرف شود.

ترشح دارو در شیر نامشخص است؛ لذا مصرف آن در خانم های شیرده توصیه نمی شود.^(۳)

هشدارها و موارد احتیاط:

- به دلیل امکان بروز واکنش های ازدیاد حساسیت تا ۳۰ دقیقه پس از تجویز دارو، پایش بیماران به خصوص افراد با سابقه ابتلا به آسم و آلرژی تا یک ساعت پس از تزریق توصیه می شود.
- به دلیل وجود بنزیل الکل در فرمولاسیون دارو، مصرف آن در کودکان زیر ۳ سال توصیه نمی شود.
- در بیماران مبتلا به پرفشاری خون، صرع، بیماری های ترومبوسیتوپنیک، بیماری های کلیوی، سیروز و بیماری های کبدی، کولیت اولسراتیو، میاستنی گراویس، اختلالات روان و سایکوز، عفونت آمیبی، پوکی استخوان، کم کاری تیروئید، سل، بیماری های چشمی مانند گلوکوم و کاتاراکت با احتیاط مصرف شود. در صورت ابتلا به هر یک از این موارد، مراتب را به پزشک خود گزارش دهید.
- در صورت استفاده ی مزم از این دارو، معاینات دوره ای چشم انجام شود.
- از تجویز هم زمان این دارو با واکسن های زنده ضعیف شده و انجام واکسیناسیون بدون نظر پزشک اجتناب شود.^(۴)

تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید .
- از مصرف همزمان تتراکوزاکتاید با داروی والهروئیک اسید و مشتقات آن اجتناب شود.

- تتراکوزاکتاید می تواند باعث افزایش سطح، تشدید اثر و تشدید عوارض کبدی داروهای کلونازپام، دیازپام، نیترازپام، فنی توئین، فنوباریتال و پریمیدون شود.^(۵)

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:

- از تزریق درون رگ خودداری شود.
- دوز تشخیصی:
- کودکان بزرگتر از ۳ سال و بزرگسالان: روزانه مقدار ۱ میلی گرم عضلانی به صورت تک دوز، به مدت ۳ تا ۴ روز بر اساس روش تشخیصی تجویز می شود.^(۶)
- دوز درمانی:
- کودکان ۳ تا ۶ ساله: شروع درمان با ۰.۲۵ تا ۰.۵ میلی گرم روزانه به صورت عضلانی می باشد. دوز نگهدارنده را می توان با همین مقدار هر ۲ تا ۸ روز ادامه داد.
- کودکان ۷ تا ۱۵ ساله: شروع درمان با ۰.۲۵ تا ۱ میلی گرم روزانه به صورت عضلانی می باشد. دوز نگهدارنده را می توان با همین مقدار هر ۲ تا ۸ روز ادامه داد.
- کودکان بزرگتر از ۱۶ سال و بزرگسالان: شروع درمان موارد حاد با ۱ میلی گرم روزانه به مدت ۳ روز به صورت عضلانی می باشد. دوز نگهدارنده بر اساس شرایط بیمار تعیین می شود. همچنین دوز دارو را می توان ۰.۵ تا ۱ میلی گرم هر ۲ تا ۳ روز یا دو بار در هفته و یا به مقدار ۲ میلی گرم یک بار در هفته یا با فواصل بیشتر تجویز کرد.^(۷)
- این دارو فقط به صورت عضلانی تزریق می شود؛ لذا از تزریق داخل وریدی آن جداً خودداری کنید.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک شخص دیده نمی شود؛ لذا در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- عوارض قلبی- عروقی (پرفشاری خون، افزایش یا کاهش ضربان قلب) و واکنش های ازدیاد حساسیت و آنافیلاکتیک، واکنش های حساسیتی (سرگیجه، التهاب و قرمزشدگی محل تزریق، راش پوستی و ادم محیطی، تورم لب و زبان یا سایر بخش های بدن)^(۸)

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما ذکر شده است، با پزشک معالج خود، داروساز یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.
- این دارو باید در یخچال و در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- دارو دور از نور نگهداری شده و از یخ زدگی محافظت شود.^(۹)
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

اشکال دارویی و بسته بندی:

تتراکوزاکتاید ال.آ. تولیدی شرکت داروسازی اکسیر، به صورت آمپول ۱ میلی لیتری در بسته بندی های ۱۰ عددی به همراه برگه راهنمای مصرف به بازار عرضه می گردد.

ساخت شرکت داروسازی اکسیر _ ایران

Reference:

1. Drug Facts and Comparisons 2015 , volume 1, Page: 567
2. lexicon Drug Information Handbook (AphA) 23th edition 2015, Page: 503
3. USPD1 27th edition 2007, volume 1, Page: 966



راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:
تلفن گویا: ۰۲۱ - ۸۸۹۱۰۹۱۰
ایمیل: exir_cc@exir.co.ir
وبسایت: www.exir.co.ir



2205693/2

EXIR 98.09.28

Text: Process Black U

Headline: 279 U

W*L : 130*180