

VITAMIN B₁ / B₆ / B₁₂ TRIBITEX®

ویتامین ب_۱ / ب_۶ / ب_{۱۲} تری بیتکس®

هر آپول سه میلی لیتری حاوی صد میلی گرم ویتامین ب_۱ (تیامین)، صد میلی گرم ویتامین ب_۶ (پیریدوکسین) و هزار میکروگرم ویتامین ب_{۱۲} (سیانوکوبالامین) به عنوان ماده مؤثره است.

موارد مصرف:

– در صورت کمبود هریک از ویتامین های B_۱, B_۶, B_{۱۲}

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمائید.

در صورت حساسیت به هریک از اجزا فرآورده پزشک خود را مطلع سازید.

موارد منع مصرف:

– در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو یا اجزا، فرآورده با پزشک خود مشورت نمائید.
– این فرآورده به دلیل وجود بنزیل الکل در نوزادان منع مصرف دارد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف دارو در دوره بارداری جز با توصیه پزشک مجاز نمی باشد.
مصرف این دارو در دوران شیردهی جز در موارد ضروری و طبق نظر پزشک توصیه نمی شود. در مورد مصرف یا تغییر دارو با پزشک خود مشورت نمائید.

هشدارها و موارد احتیاط:

– این دارو را بیشتر از دوز توصیه شده مصرف نکند.
– ویتامین B_{۱۲} معمولاً غیر سمی است. اما استفاده مزمّن از دوزهای بالا ممکن است عوارض جانبی نوروپاتیک نشان دهد.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از داروهای ذکر شده و یا سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع کنید.
– ممکن است در صورت مصرف همزمان سطح سرمی فنی توئین و یا فس فنی توئین، آنترتامین و باربیتورات ها کاهش یابد.
– ویتامین B_۶ اثر لوودوپا را کاهش می دهد.
– اینزویازید و ضد بارداری های خوراکی ممکن است نیاز به ویتامین B_۶ را افزایش دهند.
– کلرامفنیکل تزریقی ممکن است اثر B_{۱۲} را تضعیف کند.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک معین می نماید.
دارو را می توان به شکل عضلانی تزریق نمود.

عوارض جانبی:

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر و یا سایر عوارض با پزشک یا داروساز مشورت نمائید. برخی عوارض شامل موارد زیر هستند:
– در صورت واکنش حساسیتی به دارو و یا هریک از اجزا فرآورده ممکن است در مواردی شوک آنافیلاکسی رخ دهد.
– حساسیت و درد در محل تزریق عضلانی ممکن است رخ دهد هم چنین ممکن است ویتامین B_{۱۲} ایجاد خارش کند.
– نوروپاتی حساسیتی در دوزهای بالا و مصرف طولانی
– پارستزی اندام ها و نوروپاتی
– افزایش آنزیم AST کبدی

– ترومبوز عروقی، ادم ریوی و نارسیایی احتقانی قلب در درمان اولیه
– اسهال
– ویتامین B_۶ می تواند ایجاد سردرد، تشنج، بی خوابی، افزایش AST، اسیدوز متابولیک، کاهش اسید فولیک، واکنش های آلرژیک و تهوع کند.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمائید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.
از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
دارو را در یخچال (دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد) نگهداری کنید.

References:

- 1- Lexicomp's drug information handbook, 26th edition, 2018, Pages: 590, 1948, 2235.
- 2- Drug facts and comparisons 2015, volume 1, Pages: 19-20, 26, 29-30.



2205090 / I R 1

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:
تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰
ایمیل: exir_cc@exir.co.ir
وب سایت: w w w.exir.co.ir

EXIR 98.09.13
W*L: 130*180
185 U
YELLOW U
BLACK U