

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

راهنماییهای عمومی:

۱. در صورت داشتن سابقه حساسیت به این دارو یا داروهای مشابه و سابقه ابتلا به پرکاری تیروئید، دیابت، اختلالات قلبی عروقی و زیادی فشار خون موضوع را به پزشک اطلاع دهید.
۲. در صورت مصرف همزمان داروهای دیگر حتماً پزشک را آگاه کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف در دوران بارداری و شیردهی غیرمجاز است مگر در موارد اضطراری و با تجویز پزشک متخصص.

هشدارها:

- ۱) جهت بررسی پیشرفت درمان بطور دائم با پزشک در تماس باشید.
- ۲) در صورت ابتلا به بیماریهای مزمن دیگر حتماً پزشک خود را از موضوع مطلع نمایید.
- ۳) تکرار مقدار مصرف ممکن است موجب بروز واکنش متناقض اسپاسم نایژه ای شود. در این موارد سریعاً با پزشک مشورت کنید.
- ۴) اگر اشکال در تنفس تا یک ساعت بعد از مصرف دارو ادامه یابد یا علائم بیماری طی ۴ ساعت باز گردد، یا بیماری بدتر شود به پزشک اطلاع دهید.
- ۵) دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنید.
- ۶) در صورت بروز حساسیت مفرط یا واکنش متناقض نایژه ای سریعاً پزشک را آگاه کنید.
- ۷) مصرف این دارو ممکن است موجب تغییر در نتایج تستهای آزمایشگاهی شود، لذا در صورت نیاز به انجام چنین تستهایی حتماً پزشک را از مصرف این دارو آگاه کنید.
- ۸) در صورتیکه مصرف یک دوز خوراکی دارو را فراموش کردید به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف کنید اما در صورتیکه زمان مصرف شده دوز بعدی رسیده بود از مصرف دوز فراموش شده صرف نظر کنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

- ۱ - فرم خوراکی (قرص و شربت):

در بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال: مقدار ۴ - ۲ میلی گرم ۳ - ۴ بار در روز مصرف می شود.

در کودکان ۱۱ - ۶ ساله: مقدار ۲ میلی گرم ۴ - ۳ بار در روز مصرف می شود.

در کودکان ۵ - ۲ ساله: ۱ / میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن ۳ بار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف نباید از ۲ میلی گرم ۳ بار در روز تجاوز کند.

در بزرگسالان بالای ۶۵ سال: مقدار ۲ میلی گرم ۴ - ۳ بار در روز مصرف می شود.

۲ - فرم تزریقی:

مقدار ۵ / میلی گرم هر چهار ساعت بر حسب نیاز به صورت زیر پوستی یا عضلانی تزریق می شود.

جهت تزریق وریدی محتوای آمپول را با ۹ میلی لیتر آب مقطر قابل تزریق یا همین مقدار سرم فیزیولوژی رقیق کرده و ۵ میلی لیتر از این محلول را به آهستگی (۲ تا ۵ دقیقه) تزریق نمایند.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود، اگر چه تمام عوارض در یک فرد دیده نمی شوند، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

رعشه، عصبانیت، تعریق، سردرد، سرگیجه حقیقی، هیجان، بیخوابی، خون دماغ، ضعف، خواب آلودگی، سردرد، افزایش تعداد ضربان قلب، افزایش یا کاهش فشار خون، درد در قفسه سینه، تهوع، استفراغ، افزایش اشتها، سوزش سردل، اشکال در دفع ادرار، سرفه، گشادی مردمکها، دردهای عضلانی، کهیر، درماتیت و بثورات پوستی.

مسمومیت:

در صورت مصرف مقادیر بیش از حد دارو سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

- ۱) دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
 - ۲) از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
 - ۳) قرص سالبوتامول را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- آمپول و شربت سالبوتامول را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری کنید. از یخ زدگی محافظت گردد.

اشکال دارویی:

- ۱ - آمپول ۵ / میلی گرم در یک میلی لیتر (به صورت سالبوتامول سولفات)
- ۲ - قرصهای ۲ میلی گرمی سالبوتامول (به صورت سالبوتامول سولفات)
- ۳ - شربت ۱۲۰ میلی لیتری که هر ۵ میلی لیتر آن حاوی ۲ میلی گرم سالبوتامول (به صورت سالبوتامول سولفات) می باشد.