ویتامین ث

آمپول ۵۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

Vitamin C

Ampule 500mg/5ml

مشخصات دارو:

آمپول ویتامین ث (اسکوربیک اسید) تولیدی شرکت داروسازی اکسیر، حاوی ۵۰۰ میلی گرم ویتامین ث به عنوان ماده موثره در ۵ میلی لیتر می باشد که در بسته بندی های ۱۰ عددی به همراه برگه راهنما به بازار عرضه می گردد.

دسته داروئی:[1]

ویتامین محلول در آب.

راهنمایی های عمومی:[2]

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمائید.

در صورت حساسیت به هریک از اجزاء فرآورده پزشک خود را مطلع سازید.

موارد منع مصرف:[1]

منع مصرف خاصی برای این دارو وجود ندارد، در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو یا اجزاء فرآورده با پزشک خود مشورت نمائید.

از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمائید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:[2]

مصرف این دارو در دوران بارداری در رده C قرار دارد و مصرف آن فقط با نظر پزشک مجاز می باشد.

مصرف این دارو در دوران شیردهی با توجه به ترشح دارو در شیر باید با احتیاط صورت گیرد.

تداخلات داروئی:[2و3]

ویتامین ث با داروهای ذیل تداخل دارد:

دفریپرون، دفروکسامین[3]

داروهای ضد انعقاد نظیر: وارفارین، دی سولفیرام، بیس هیدروکسی کومارین.

داروهای اسیدی کننده ی ادرار: به علت اسیدی شدن ادرار توسط ویتامین ث، ممکن است باعث ایجاد رسوب سیستئین، اوریک اسید و سنگ اگزالات شود و بر دفع برخی داروها در صورت مصرف همزمان موثر می باشد.

تداخل با برخی تست های آزمایشگاهی: به علت اینکه ویتامین ث یک عامل کاهنده بسیار قوی است، بر اساس واکنش های اکسایش-کاهش بر نتایج برخی تست های آزمایشگاهی موثر می باشد، به عنوان مثال در بیماران دیابتی مصرف بیش از ۵۰۰ میلی گرم روزانه ویتامین ث باعث نتیجه کاذب منفی تست گلوکز ادرار می گردد، لذا ۴۸ الی ۷۲ ساعت قبل از انجام تست های آزمایشگاهی از مصرف این دارو خودداری نمائید.[2و3]

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک و یا داروساز خود را مطلع نمائید.

هشدارها و موارد احتیاط:[2]

- در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

- استفاده طولانی مدت ویتامین ث با دوزهای بالا ممکن است باعث بروز واکنش های حساسیتی در افراد زیر شود:

بیماران دیابتی، بیماران با سابقه ابتلا به اختلالاتی نظیر سنگ کلیه و خون مخفی در مدفوع، بیمارانی که تحت رژیم های با سدیم محدود می باشند و بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مصرف می کنند.

- تزریق وریدی سریع این دارو به علت احتمال بروز سرگیجه و عدم هوشیاری توصیه نمی شود.

- این دارو حاوی سدیم متابی سولفیت می باشد و مصرف این دارو در برخی افراد بویژه در بیماران مبتلا به آسم باید با احتیاط صورت بگیرد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:[1و2]

مقدار و نحوه مصرف دارو توسط پزشک مشخص می شود اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

تجویز دارو به صورت تزریق عضلانی (IM)، تزریق آهسته انفوزیون وریدی (IV Infusion)، می تواند صورت گیرد.

در صورت تزریق انفوزیون وریدی به منظور رقیق سازی با سرم های نرمال سالین و دکستروز ۵% سازگار می باشد.

انفوزیون وریدی باید آهسته صورت بگیرد و از تزریق وریدی سریع خودداری نمائید.

بزرگسالان و سالمندان:

کمبود ویتامین ث: ۱۵۰ – ۷۰ میلی گرم روزانه، و در صورت نیاز با صلاحدید پزشک می تواند مقادیر بالاتر هم تجویز شود.

سوختگی: ۱ الی ۲ گرم روزانه، در سوختگی های شدید دوز دارو می تواند با توجه به سطح سوختگی تعیین گردد.

بهبود جراحت و زخم: ۵۰۰ - ۳۰۰ میلی گرم روزانه به مدت ۷ الی ۱۰ روز، قبل و یا بعد از عمل جراحی . در صورت نیاز با صلاحدید پزشک می تواند مقادیر بالاتر هم تجویز شود.

اسکوروی: ۱۰۰۰ – ۳۰۰ میلی گرم روزانه، مقدار و مدت زمان دوز مصرفی با توجه به شرایط هر بیمار تعیین می گردد.[1]

کودکان: به دوز بزرگسالان مراجعه شود.

سالمندان: مصرف روزانه حداقل ۴۰۰ میلی گرم به ویژه در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن نظیر: بیماری های قلبی- عروقی، سکته، آب مروارید و برخی سرطان ها توصیه می شود.[2]

عوارض جانبی دارو:[2]

هردارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز هر یک از عوارض ذیل با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

اسیدی شدن ادرار که می تواند منجر به ایجاد سنگ کلیه گردد.

تزریق عضلانی با احتمال بیشتری ممکن است موجب ایجاد درد و واکنش های محل تزریق شود.

تزریق وریدی سریع این دارو ممکن است باعث بروز سرگیجه و عدم هوشیاری شود.

مسمومیت: در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمائید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:[2]

دارو را در یخچال در دمای ۸ - ۲ درجه سانتی گراد، در بسته بندی اصلی و دور از نور نگهداری نمائید و تا قبل از تزریق از قرار دادن در دمای محیط خودداری نمائید.

دارو را از یخ زدگی محافظت نمائید.

از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

فرآورده یکبار مصرف می باشد و باقیمانده دارو را پس از مصرف دور بریزید.

فرآورده بی رنگ، شفاف و عاری از ذره می باشد در غیر این صورت از مصرف دارو خودداری نمائید.

References:

1- Lexicomp Drug Information Handbook, 2017- 2018, 26th edition, Page: 186

2- Drug facts and comparisons, 2015, Pages: 34-37

3- BNF 74, 2018, Pages: 987, 991, 1297

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:

تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰

ایمیل: exir_cc@exir.co.ir

وب سایت: www.exir.co.ir

اکسیر

شرکت داروسازی اکسیر

2205118/ 1

EXIR 98.09.14

W*L: 130*180

7549 U

287 U