

ZEXIFEN®

Ketotifen Syrup 1mg/5ml

زکسیفن®

شربت کتوتیفن ۱ mg/۵ml

مشخصات دارو:

شربت زکسیفن® ۱ mg/۵ml شرکت داروسازی اکسیر با حجم ۱۲۰ میلی لیتر در هر بطری، همراه با پیمانه و برگه راهنما به بازار عرضه می شود.

دسته دارویی:

آنتاگونیست هیستامین H₁، مشتق پپیریدین.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

۱. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:
– در صورت حساسیت به کتوتیفن یا سایر اجزای موجود در فرمولاسیون.
۲. در زمان مصرف این دارو از رانندگی و یا کار با ابزارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

موارد منع مصرف:

– در صورت حساسیت به کتوتیفن یا سایر اجزای موجود در فرمولاسیون.

مصرف در بارداری و شیردهی:

– ایمنی این دارو در دوران بارداری اثبات نشده است.
– دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

– این دارو در پیشگیری یا درمان حملات حاد آسم موثر نمی باشد بلکه درمان علائم حاد آسم با داروهایی نظیر کورتیکواستروئیدها، آگونیست های بتا ۲، مشتقات گزانتین می بایست ادامه و به مرور زمان کاهش یابد.

– جهت مشاهده پاسخ درمانی مناسب می بایست این دارو به مدت چند هفته مصرف شود در مواردی که حداکثر پاسخ درمانی مورد نیاز است مصرف دارو می بایست بیش از ۱۰ هفته ادامه داشته باشد.

– درمان با این دارو می بایست حداقل به مدت ۲ الی ۳ ماه جهت ارزیابی اثربخشی ادامه یابد.
– در صورت نیاز به قطع درمان با کتوتیفن، دارو را طی ۲ الی ۳ هفته به صورت تدریجی قطع نمایید.
– این دارو در زمان مصرف دوزهای اولیه اثرات خواب آوری ایجاد می کند. در صورتی که درمان با نصف دوز روزانه توصیه شده آغاز و به تدریج طی ۵ روز به دوز نگهدارنده افزایش یابد، اثرات خواب آوری می تواند کاهش می یابد.
– مصرف همزمان کتوتیفن با ترکیبات آنتی دیابتیک خوراکه به ندرت می تواند منجر به ترومبوسیتوپنی گردد.

– در بیماران مبتلا به مرع و بیماران دیابتی، کتوتیفن می بایست با احتیاط مصرف شود.

– در همراه غذا یا بلافاصله بعد از آن میل نمایید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی از کتوتیفن گزارش نشده است.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

آسم آتوپیک (درمان پروفیلاکسی)

– کودکان ۶ ماه تا ۳ سال:

دوز اولیه: ۰/۵ میلی گرم بر کیلوگرم یک بار در روز یا در دو دوز منقسم به مدت ۵ روز.

دوز نگهدارنده: ۰/۵ میلی گرم بر کیلوگرم دو بار در روز (حداکثر دوز: ۱ میلی گرم دو بار در روز).

– کودکان بالای ۳ سال:

دوز اولیه: ۱ میلی گرم یک بار در روز یا در دو دوز منقسم به مدت ۵ روز.

دوز نگهدارنده: ۱ میلی گرم دو بار در روز.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض غیر از آنچه دربرگه راهنما ذکر شده است با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض غیر نادر:

عوارض سیستم عصبی مرکزی (سر درد، خواب آلودگی، اختلال در خواب)، عوارض پوستی (راش، کهیر و خارش)، عوارض گوارشی (درد شکم، افزایش اشتها، افزایش وزن)، عوارض تنفسی (عفونت تنفسی، خونریزی از بینی)، سندرم شبه آتفولانزا و پف کردن پلک.

سمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

– دارو را در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد)، دور از نور نگهداری و از ریخ زدگی محافظت نمایید.

References:

1. USPDI, Drug Information for the health care professional, 2007, 27th edition, volume 2, pages: 1768-1771

2. Lexicomp Drug information handbook, 2015, 23rd edition, Page: 1168



شرکت داروسازی اکسیر

تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰۰



2205796/IR1

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:
تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰
ایمیل: exir_cc@exir.co.ir
وب سایت: www.exir.co.ir