

مشخصات دارو:

زمکسیر ساخت شرکت داروسازی اکسیر به صورت گیسول های حاوی ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم ماده موثره آریتروماپسین (به صورت دی هیدرات) و پود آمده برای تبدیل سوسپنسیون های حاوی ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم آریتروماپسین (به صورت دی هیدرات) در هر ۵ میلی لیتر به همراه بزرگ راشنها باز از عرضه می گردد.

سدته دراپی:

آنست بیوتیک ماکرواید^(۱)

راهنمایی های عمومی:

این دارو جفت داران بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و تامونیه آن به دیگران جدا خودداری کنید.

قالی از مصرف سایر موارد به بیش از ۵ برابر مقدار معرف نمایید:

- در صورت سایر داروهای خود خود را باز نشک بازرسی می کنید.

- در صورت مصرف سایر داروهای خود خود را باز نشک بازرسی می کنید.

- در صورت مصرف دارو به کوچه بیماری دیگری به خصوص مشکلات کبدی.

در هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید پس از یادآوری پلافلوئن آن را مصرف کنید، اما تناقض نزدیک به زمان

صرف نوبت بعدی بود از مصرف این دور مصرف نظر کرده و مخازن مصرف نوبت بعدی را در پرداز نکنید.

- در این روز از قاعده های مصرف دارو را کامل نمایید و دو روز بعد مصرف دارو را بپنهان نهاده.

- در صورتی که از تکمیل مصرف دارو بپنهان باشید بزرگ راشنها باز از عرضه می گردند.

- قرمن یا کپسول آریتروماپسین را می توان بدون وجود بغا مصرف کرد. اما جهت کاهش عوارض گوارشی می توان آن را با غذا مصرف کرد.

- چک قرم سوسپنسیون در صورت مصرف همراه غذا تا ۶۰٪ افزایش می یابد.^(۲)

مورد منع مصرف:

سایده اخたلالات کبدی ناشی از مصرف پیشین آریتروماپسین و یا تاریخ اجزا فرمولولیسین

صرف در بارداری و شیردهی:

- صرف این دارو در رده B بارداری اعلاءات کافی و مالالات کنترل شده ای مفروظ به مصرف آریتروماپسین در دوران بارداری وجود ندارد و با توجه به عبور دارو از جفت صرف دارو می باشد.

- پژشک سنجیده شود.

- با توجه به ترشی این دارو در شبیه، جفت صرف دارو می باشد فواید آن بر مضراتش توسعه پژشک سنجیده شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

- تجویز آریتروماپسین در نوزادان زیر ۶ ماه تایید نشده است.

- مصرف آریتروماپسین در افراد مسن که عملکرد کبد و کلیه آن ها نزدیک است نیاز به تنظیم دوز ندارد.^(۳)

- آریتروماپسین در بیماران مبتلا به بیاضتگی، ترومیوسپاپتوپنی، اختلالات قلبی و عروقی، احتلالات کبدی و کلیوی می باشد.^(۴)

- مصرف آریتروماپسین در بیماران با ساقه اختمالات کبدی مانند هیاتوسالوان، هیاتیت کلستاتیک، با یا بدون زردی.

- تکروز کبدی، نارسایی و مرگ رخ داده است و با احتیاط مصرف شود. در صورت مشاهده علامت التهاب هیاتیت

(شامل: ای فرقی، استفسنگ و تهوع) فوراً مصرف دارو از طلاقه ممکن است در صورت

- مصرف آریتروماپسین در نوزادان و کودکان زیر ۵ کسال با احتیاط مصرف شود.^(۵)

- قرای و استفسنگ کوکد به نیزه مراجعت نمایید.^(۶)

- مصرف آریتروماپسین ممکن است باعث بروز واکنش های حساسیتی جدی گردد. در صورت مشاهده علامت آکریواید، آنافلایکسی و واکنش های حساسیتی موقت مانند TEN^(۷) و SJS^(۸) و آنکشن های حساسیتی کلرکوکسی، ایواپرایدین، میمه پریستون، پیموزاید، پریوازین، ترفکنادین، کیشین و در صورت مصرف سایر داروهای آریتروماپسین خود را در این اتفاق مواجه نمایید.^(۹)

- مقدار و توجه مصرف هر دارو را پژشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بروزگانان، زندگانان، بزرگسالان و نوجوانان بالاتر از ۱۶ سال:

کپسول / قرص آریتروماپسین:

سینوپزیت باکتریایی حاد: ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۳ روز

درمان عقوفون سیستم تنفسی، فارگزیت، پتوهون، عقوفون های پوست و پافت های نرم، دونسیلیت، روز اویل ۵۰۰ میلی گرم کد دوز سیس ۲۵۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۲ تا ۵ روز

*: Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis
**: Toxic Epidermal Necrolysis

درمان سروپیت غیر گنوکوکی و شانکرونید (ذاشی از عقوفون باکتریایی هموافلوبوس دوکرنی و کلامیدیا تراکومایسیس) در مردان و اوتریپیسیت غیر گنوکوکی؛ گزک به مورت تک دور.

عقوفون باکتریایی پیچیده شاشی از مایکوباتریکروم اوپوهم؛ بیماری های واگندر در بیماران HIV: ۵۰۰ میلی گرم روزانه همراه با اتابیوتول.

بیماری های واگندر در ترتیب پاسخ به درمان های ضد ویروسی، مقدار CD۴ بیمار به مدت حداقل ۳ ماه بیشتر از ۱۰۰ cells/mm³ پیشگیری تاثیری دارد. بیمار به مدت حداقل ۶ ماه بیشتر از ۱۰۰ cells/mm³ پیشگیری هدگامی که بیمار در نتیجه داشت دفعه هی کرد.

کودکان: سوسپنسیون آریتروماپسین:

ظریف بیمه: ابتداء طبقه بیمه از کدام دهدی ترازات پور از هم باز شود سیس آب جوشیده سرد شده را در مرحله تا خط شناخته روزی روی طبیعی به وجود اضافه کنید و در هر مرحله به قوی تکان دهدی سوسپنسیون بکوخته به سمت آمد.

درمان بیهویت باکتریایی (آریتروماپسین ۵۰۰ میلی گرم روزانه) به مدت ۳ روز:

درمان اوتیت میانی گرم روزانه ۱۰ میلی گرم روزانه و زنگنه: ۱۰ میلی گرم روزانه و زنگنه.

درمان دک دوز میانی گرم روزانه ۱۵ میلی گرم روزانه (ماکریم ۱۵۰ میلی گرم روزانه).

- درمان ۳ روزه: ۱۰ میلی گرم به ازی هر کلاروگرم و وزن بدن (ماکریم ۵۰۰ میلی گرم روزانه) به مدت ۳ روز.

- درمان ۵ روزه: ۱۰ میلی گرم به ازی هر کلاروگرم و وزن بدن (ماکریم ۲۵۰ میلی گرم روزانه) از روز اول، سیس ۵ میلی گرم به ازی هر کلاروگرم و وزن بدن (ماکریم ۱۵۰ میلی گرم روزانه) از روز ۲ تا ۵.

پتوهون: نوزادان تیرگان ۱۰ میلی گرم روزانه (ماکریم ۲۵۰ میلی گرم روزانه) از روز اول.

درمان هارجیت و توسیلیت: کودکان ۱۲ تا ۱۶ سال: ۱۰ میلی گرم به ازی هر کلاروگرم از وزن بدن تا ۵۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۳ روز.

عوارض جانبی:^(۱)

هر دارو به موارد اشارات مطابق درمانی ممکن است باعث بروز بیرونی از عوارض ناخواسته شود. اگرچه همه ای این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض نزیر یا عوارض غیر از عوارض ناخواسته شود. اگرچه همه ای این پژشک یا داروساز خود شوشت مطابق:

- سیستم قلبی و روزگار: تپش، قلب، درد قفسه سینه.

- سیستم مغزی: سرسکونی، خواب آگدی، سکته سینه.

- تاگیری پوستی، قریزی، راش، خارش، حساسیت به نور.

- سیستم دهون: ریزی، کاهش گلوكز سرم، افزایش آنزیم ترانزیتر گامات اگلوتامیل، افزایش لکاتات دهدیزوناز، افزایش سرمه.

- افزایش میانی: افزایش سرمه، افزایش میانی همراه با افزایش سرمه.

- افزایش همراه با افزایش سرمه، افزایش کلاروگرم و همراه با افزایش سرمه.

- افزایش همراه با افزایش سرمه، افزایش کلاروگرم و همراه با افزایش سرمه.

- سایر ای: افزایش اردو و کرتبه ای سرمه، افزایش تغیریت.

مسعوبیت: در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدیر تومیه شده سریعاً به پژشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

هزارگی: همراه با افزایش سرمه و همراهی از عورق:

- دارو را در اس دسترسی دارد، دور از نور و رطوبت نگهدازی و از برق داشتن نگهدازی نمایید.

- از عورق و نگهداری داروهای راریج گذشته خودداری نمایید.

- دارو را در دام اگهار از ۳ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهدازی و از برق داشتن نگهدازی نمایید.

- سوسپنسیون آریتروماپسین پس از آماده سازی در پیچان نگهداری شود و باقی مانده آن را پس از ۱۰ روز بربزید.

References:

- 1- Lexicomp Drug information hand book, 2018, 26th edition, Pages: 230-235
- 2- AHFS Drug information, 2014, volume 1, Pages: 202-219

راه های تماش با هرگونه پیشنهاد یا مکاینه:

تلنن گویا: اینلین، و سایت:

ext_r_ir.co.ir و www.ext_r_ir.co.ir



2205591 / IRS

W * L : 100 * 145

288 C

259 C