

آکاربکس® اکاربوز

ACARBEX® Acarbose

مشخصات دارو:
آکاربکس تولیدی شرک داروسازی اکسیر، به صورت قرص های خط دار حاوی ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم ماده موثره آکاربوز در بسته بندی های ۳ عددی به همراه بروشور به بازار عرضه می گردد.

موارد مصرف دارو:
این دارو مهار کننده آلفا گلوكوزیداز می باشد و به منظور کاهش قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تجویز می شود.^(۱)

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جلو خودداری نمایید.

- در طول درمان با این دارو، رژیم غذایی و فعالیت های ورزشی توصیه شده توسط پزشک را کاملاً رعایت کنید.

- این دارو را همراه با اولین لقمه هر وعده غذایی مصرف کنید.^(۲)

- مصرف دارو در زمان مناسب را فراموش نکنید. اگر پس از میل کردن غذا متوجه شدید که داروی خود را فراموش کرده اید آن نوبت را مصرف نکنید و هنگام شروع وعده غذایی بعدی مقدار معمول داروی خود را مصرف کنید. از دو برابر کردن مقدار دارو به جای نوبت فراموش شده خودداری کنید.^(۲)

- جهت اطمینان از کنترل بیماری خود به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.

موارد منع مصرف:

- حساسیت به آکاربوز یا هریک از اجزای فرمولاسیون.^(۱)

- در صورت ابتلاء به کوواسیدوز ناشی از دیابت، سیروز کبدی، بیماری التهابی روده، زخم یا انسداد گوارشی و یا استعداد اپتیلا به آن، بیماری های مزم زوده ای همراه با اختلالات سوء جذب و بلع، مشکلاتی که با افزایش تولید گاز در روده شدید می شوند.^(۱)

صرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری در گروه B قراردارد و در صورت لزوم تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

- مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.^(۱)

هشدارها و موارد احتیاط:

- از مصرف غمزمان این دارو با سایر داروها بدون تجویز پزشک احتیاب کنید.

- در صورت پرور هریک از موارد زیر در مورد ادامه مصرف آکاربوز با پزشک متخصص مشورت نمائید:
* مصرف هم زمان این دارو با سایر داروهای ضد دیابت مانند انسولین و داروهای سولفونیل اوره که ممکن است باعث افزایش احتمال پرورافت قند خون شود.

* مواجه شدن با شرایط استرس زا مانند تب، عفونت، جراحی

* افزایش پایدار در سطح آنزیم های ترانس آمیناز کبدی

* نقص شدید عملکرد کلیوی

* بارداری و شیردهی^(۱)

تداخلات دارویی:

- در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

- از مصرف هم زمان این دارو با آنزیم های گوارشی مانند پانکراتین و آمیلاز و داروهای جاذب مانند زغال فعال که باعث کاهش اثربخشی آکاربوز می شود احتیاب شود.^(۱)

علووه بر این اثربخشی آکاربوز با مصرف هم زمان داروهای کورتیکواستروئیدی، دیورتیک های لوپ، دیورتیک های

تیازیدی و سوماتروپین کاهش می یابد.^(۱)

- مصرف هم زمان آکاربوز با دیگوکسین می تواند باعث کاهش غلظت پلسمایی دیگوکسین شود و نیاز به تنظیم دوز دارد.^(۱)
- اثربخشی آکاربوز با مصرف هم زمان داروهای مهار کننده موتو آمینو اکسیدار، مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین، نورماسین و سالیسیلات ها افزایش می یابد.^(۱)
- مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معنی می نماید، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:
برگ‌سالار: با دارو اولیه ۲۵ میلی گرم سه بار در روز آغاز می شود، در صورت لزوم و با تجویز پزشک با فاصله ۴ تا ۸ هفته می تواند تا مقدار ۵ میلی گرم سه بار در روز و حد اکثر ۱۰ میلی گرم سه بار در روز افزایش یابد.^(۱)
- حداکثر دوز جائز مصرف:
 - در افراد با وزن کمتر از ۶۰ کیلوگرم: ۵۰ میلی گرم، سه بار در روز.^(۱)
 - در افراد با وزن بیشتر از ۶۰ کیلوگرم: ۱۰۰ میلی گرم، سه بار در روز.^(۱)
- کوکان: در مردم اثربخشی و بی عارضه بودن مصرف آکاربوز در کوکان اطلاعات دقیقی در دست نیست.^(۱)
- عارض جانشی دارو:
 - هر دارو به سوابقات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عارضه ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عارضه بیشتر از ۱۰٪ از مصرف آکاربوز می شوند.
 - عارضه که در صورت بروز بیشتر باید به پزشک مراجعه کرد:
 - زرد شدن چشم ها یا پوست
 - قرمزی، کبیر و راش پوستی
 - ادم و تورم
 - عارضه که خود به خود بطریف می شوند ولی در صورت تداوم آنها باید با پزشک مشورت نمود:
 - درد در ناحیه شکم
 - اسهال
 - نفخ شکمی^(۱)
- در صورت بروز عارضه غیر از آنچه در برگ راهنمای قید گردیده با پزشک معالج خود، داروساز و یا مراکز درمانی تماس پذیری.
مسمومیت:
 - در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- شرایط نگهداری دارو:
 - دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
 - در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری شود.

ساخت شرکت داروسازی اکسیر - ایران

References:

- 1) Drug facts and comparisons 2015, volume 1, page: 522.
- 2) Lexicomp Drug information hand book (AphA) 23rd edition 2015, page: 28.
- 3) USPDI, Drug information for the health care professional 27th edition 2007, volume 1, page: 13.

راه های تماس با شرکت وارکه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:
تلفن گویا:
ایمیل:
وب سایت:
+۹۱-۸۸۹۱۷۰۰۰
exir_cc@exir.co.ir
www.exir.co.ir



EXIR 31 05 95
145 x 100 mm
320 U