

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری کنید.

#### دسته دارویی:

ضد افسردگی، مهارکننده ی باز جذب دوپامین، کمک کننده در ترک سیگار<sup>(۱)</sup>

#### راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

– در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا سایر اجزا، فرآورده

– در صورت بارداری و یا شیردهی

– در صورت سابقه تشنج و یا مصرف داروهای ضد صرع

– در صورت وجود مشکلات کلیوی و کبدی

– در صورت مصرف داروهای دیگر<sup>(۲)</sup>

#### موارد منع مصرف:

– در صورت حساسیت شدید به این دارو

– در صورت مصرف داروهای مهار کننده ی مونو آمین اکسیداز، پیموزاید، تاموکسیفن، تیوریدازین، لینزولاید و تزریق وریدی متیلن بلو.

– در بیمارانی که در مرحله قطع ناگهانی داروهای آرامبخش (مانند بنزودیازپین ها) و یا الکل هستند.

– در بیمارانی که سایر اشکال دارویی بوپروپیون را همزمان استفاده می کنند.

– در بیمارانی با سابقه تشنج یا در صورت ریسک بالای تشنج<sup>(۳)</sup>

#### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری در گروه C قرار دارد و می بایست مزایای مصرف این دارو نسبت به مضرات آن سنجیده شود.

این دارو در شیر ترشح می شود لذا مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.<sup>(۴)</sup>

#### هشدارها و موارد احتیاط:

– این دارو را فقط در صورت تجویز پزشک و طبق دستور مصرف نمایید.

– از افزایش ناگهانی میزان مصرف دارو و یا قطع ناگهانی آن بدون دستور پزشک خودداری کنید.

– در هنگام درمان با این دارو از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند بپرهیزید.<sup>(۵)</sup>

#### تداخلات دارویی:

این دارو با داروهای ضد افسردگی، ضد جنون، ضد آریتمی، مهار کننده های مونو آمین اکسیداز، استروئیدهای سیستمیک، داروهای القا کننده ایزو آتزیم CYP2B6، تتوفیلین و الکل تداخل دارد.<sup>(۶)</sup>

#### مقدار و نحوه ی مصرف:

مقدار و نحوه ی مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

– درمان افسردگی در بزرگسالان:

۱۵۰ میلی گرم یک بار در روز (صبح ها)، در صورت تحمل دوز طی ۴ روز، به مقدار ۳۰۰ میلی گرم در روز

افزایش یابد.

اگر بعد از چند هفته علائم بالینی بهبود نیافت می توان دوز را به مقدار ۴۵۰ میلی گرم در روز افزایش داد. – ترک سیگار در بزرگسالان:

۱۵۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت سه روز، دوز مصرفی را می توان به مقدار ۱۵۰ میلی گرم دو بار در روز افزایش داد. درمان می بایست به مدت ۷ الی ۱۲ هفته ادامه یابد.

– کودکان:

مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود.

توجه: این دارو می بایست به طور کامل بلعیده شود، از جویدن و یا نصف کردن آن خودداری کنید.<sup>(۱)</sup>

#### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک شخص دیده نمی شود لذا در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

عوارض قلبی عروقی (آریتمی، درد قفسه سینه، تکیکاردی، افزایش و یا کاهش فشار خون)، عوارض سیستم عصبی مرکزی (گیجی و سردرد، اختلال در خواب، آرتیاسیون، اضطراب، افسردگی، میل به خودکشی)، عوارض پوستی (راش و خارش)، عوارض گوارشی (درد شکم، اسهال، استفراغ و کاهش وزن)، عوارض عصبی – عضلانی (ضعف، درد گردن و مفاصل)، عوارض تنفسی (سرفه، سینوزیت، فارتزیت)، اختلال در بینایی و شنوایی.<sup>(۱)</sup>

#### مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

#### شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته جداً خودداری نمایید.

دارو را در دمای اتاق و در بسته بندی اولیه نگهداری نمایید.

#### اشکال دارویی و بسته بندی:

قرص بوپروکسیر® پیوسته رهش شرکت داروسازی اکسیر با دوز ۱۵۰ میلی گرم از ماده موثره بوپروپیون هیدروکلراید به صورت ۶ بلیستر ۱۰ عددی همراه با برگه راهنما در یک جعبه به بازار عرضه می گردد.

ساخت شرکت داروسازی اکسیر – ایران

#### References:

- 1) Lexicomp's Drug References Handbooks, 23<sup>rd</sup> Edition pages: 300-304
- 2) Drug facts and comparisons 2010, pages:1355-1365

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:

تلفن گویا: ۰۲۱ - ۸۸۹۱۰۹۱۰

ایمیل: exir\_cc@exir.co.ir

وب سایت: www.exir.co.ir



2205610/IR1