



در هر حال در صورت باردار بودن یا قصد باردار شدن و نیز در صورت شیردهی به نوزاد ، قبل از شروع به مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید .

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود . اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید .
عوارضی که بیشتر در بیماران مصرف کننده این دارو دیده شده است شامل بی قراری ، خشکی دهان ، بیخوابی ، سردرد ، تهوع و استفراغ ، بیبوست و گاهی لرزش می باشد .

از عوارض دیگر این دارو پایین آمدن آستانه تشنج است که می تواند در افرادی که سابقه تشنج داشته اند باعث بروز تشنج گردد .

هشدارها :

- ۱ . این دارو را فقط در صورت تجویز پزشک و طبق دستورات پزشک مصرف نمایید .
- ۲ . از افزایش ناگهانی میزان مصرف و یا قطع ناگهانی مصرف دارو بدون نظر پزشک جداً خودداری نمایید .
- ۳ . در صورت داشتن سابقه هرگونه تشنج یا تحت درمان بودن با داروهای ضد تشنج حتماً پزشک خود را مطلع نمایید .
- ۴ . هنگامی که تحت درمان با این دارو هستید از انجام دادن کارهایی که نیاز به دقت و مهارت زیاد دارد خودداری نمایید .

تداخلات دارویی :

چون این دارو بطور وسیع توسط کبد متابولیزه می شود مصرف همزمان داروهای دیگر ممکن است روی اثربخشی آن تاثیر گذارد . لذا از مصرف همزمان داروهای زیر با این دارو خودداری نمایید .

داروهای ضد افسردگی ، داروهای ضد جنون ، داروهای ضد آریتمی قلبی ، داروهای مهارکننده آنزیم MAO ، استروئیدهای سیستمیک و تئوفیلین

شرایط نگهداری :

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید .
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .
- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری فرمائید .

بسته بندی :

بوپروپیون - اکسیر به صورت قرصهای حاوی ۷۵ یا ۱۰۰ میلی گرم بوپروپیون هیدروکلراید توسط شرکت داروسازی اکسیر تولید و عرضه می شود .

ساخت شرکت داروسازی اکسیر - ایران

Reference : PDR59



بوپروپیون - اکسیر
بوپروپیون هیدروکلراید

BUPROPION - EXIR
Bupropion Hydrochloride

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید .

راهنمایهای عمومی :

- ۱ . قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :
- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو یا سایر داروهای ضد افسردگی ، نیز حساسیت به هر نوع ماده غذایی ، رنگ و یا ماده محافظ
- در صورتی که هرگونه داروی دیگری را مصرف می کنید یا قصد استفاده از هرگونه داروی بدون نسخه را دارید .
- در صورتی که باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید .
- در صورتی که هرگونه سابقه تشنج دارید یا تحت درمان با هرگونه داروی ضد صرع هستید .
- در صورتی که مجبور به انجام کاری هستید که نیاز به مهارت و دقت خاص و یا قضاوت صحیح دارد .

۲ . اگر بگ نوبت مصرف دارو را فراموش کردید پس از یادآوری بلافاصله آن را مصرف کنید ولی چنانچه نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر کنید و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید .

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو در افراد بزرگسال در ابتدا ۲۰۰ میلی گرم در روز می باشد که بصورت ۱۰۰ میلی گرم دوبار در روز مصرف می گردد . براساس پاسخ بیمار و نیاز به افزایش دوز می توان میزان مصرف دارو را به ۳۰۰ میلی گرم در روز افزایش داد که در این صورت ۱۰۰ میلی گرم سه بار در روز مصرف می گردد .

توجه : قبل از افزایش میزان مصرف دارو باید حداقل ۳ روز میزان روزانه فعلی را مصرف کرده باشید .
حداکثر مقدار مصرف دارو در هر نوبت ۱۵۰ میلی گرم می باشد .

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

مطالعات دقیق و کنترل شده ای در زنان باردار در مورد اثرات این دارو صورت نگرفته است ، به همین خاطر این دارو در صورتی در زنان باردار مصرف می گردد که منافع آن در مقابل مضار آن سنجیده شود . چون این دارو در شیر مادران شیرده ترشح می شود و ممکن است عوارض جدی را در نوزاد شیرخوار داشته باشد یا باید نوزاد از شیر مادر تغذیه نشود و یا در صورت امکان مصرف دارو توسط مادر متوقف گردد .



MA305
70M0410302
W/L: 100*145 mm
2205604/1