

کاپتوپریل - اکسیر کاپتوپریل

CAPTOPRIL-EXIR Captopril

اشکال دارویی و بسته بندی:

کاپتوپریل شرکت اکسیر به صورت قرص های خط دار ۲۵ و ۵۰ میلی گرم در بسته بندی های ۱۰۰ عددی به همراه بروشور به بازار عرضه می گردد.

دسته دارویی:

مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنگیوتانسین / ضدپرفشاری خون

موارد مصرف دارو:

نفروپاتی دیابتی، نارسایی قلبی، پرفشاری خون، نارسایی بطن چپ پس از سکته قلبی^(۱)

راهنمای های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

بهمتر است دارو یک ساعت قبل از غذا مصرف شود.

موارد منع مصرف:

حساسیت به کاپتوپریل یا هر یک از اجزای فرمولاسیون

حساسیت به سایر داروهای مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنگیوتانسین^(۲)

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری در گروه D قرار دارد و می تواند باعث آسیب یا مرگ جنین شود. دارو در شیر ترشح میشود و مصرف آن در شیردهی توصیه نمی شود.^(۳)

هشدارها و موارد احتیاط:

- واکنش های آنافیلاکتیک به صورت نادر ممکن است در اثر مصرف مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنگیوتانسین رخ دهد
- در بیماران دچار نارسایی کلیوی، دیابتی و افرادی که هم زمان داروهای نگه دارنده پتاسیم استفاده می کنند، ریسک هایپرکالمی وجود دارد.

- احتمال افت فشار خون به خصوص در بیماران که حجم از دست داده اند، وجود دارد.

- داروهای خانواده مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنگیوتانسین می توانند باعث اختلالات جدی در جنین شوند، به محض اطلاع از بارداری دارو باید قطع شود.

- سرفه در اثر مصرف داروهای این خانواده ممکن است رخ دهد، قبل از قطع دارو از سایر علل ایجاد کننده سرفه اطمینان حاصل کنید.

- در بیماران که جریان خون کلیوی آنها کم باشد، احتمال افزایش سرم کراتینین و یا کاهش عملکرد کلیوی وجود دارد.^(۴)

- سرفه در اثر مصرف داروهای این دسته دارویی ممکن است رخ دهد، قبل از قطع دارو از سایر علل ایجاد کننده سرفه اطمینان حاصل کنید.

- در بیماران که جریان خون کلیوی آنها کم باشد، احتمال افزایش سرم کراتینین و یا کاهش عملکرد کلیوی وجود دارد.^(۵)

تداخلات دارویی:

- کاپتوپریل می تواند باعث افزایش اثر داروهای ضد فشارخون، آلدوپوریتول، آزاتیوپرین، سیکلوسپورین، دولوکستین، لیتیم، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و ... گردد.

- سطح خونی کاپتوپریل ممکن است با داروهای زیر افزایش پیدا کند: آبیرون استات، کاناکلیفلوزین، اپلانون، پنتوکسی فیلین و ...

- سطح خونی کاپتوپریل ممکن است با داروهای زیر کاهش پیدا کند: آنتی اسیدها، متیل فنیدات، سالیسیلات ها، یوهیمین و ...^(۶)

مقدار نحوه صحیح مصرف دارو:

نفروپاتی دیابتی: دوز معمول ۲۵ میلی گرم سه بار در روز می باشد.

نارسایی قلبی: دوز معمول ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم سه بار در روز و حداکثر دوز مجاز روزانه ۴۵۰ میلی گرم می باشد.

دوز شروع: ۲۵ میلی گرم سه بار در روز. شروع دوز با ۶/۲۵ میلی گرم یا ۱۲/۵ میلی گرم سه بار در روز می تواند در

بیماران با فشار خون پایین یا نرمال، در بیماران تحت درمان با دیورتیک ها که ممکن است هایپوناترمیک یا هایپوولمیک باشند، مدت و مقدار اثر افت فشار دارو را کاهش دهد. برای این بیماران رساندن دوز به مقدار معمول روزانه می تواند طی چند روز صورت گیرد.

شروع درمان باید با در نظر گرفتن مصرف اخیر دیورتیک ها و احتمال از دست دادن حجم نمک باشد.

کاپتوپریل معمولاً باید به همراه یک دیورتیک یا دیورتیکال داده شود.

پرفشاری خون:

دوز معمول: ۲۵ تا ۱۵۰ میلی گرم ۲ تا ۳ بار در روز و حداکثر دوز مجاز روزانه ۴۵۰ میلی گرم می باشد.

دوز شروع: ۲۵ میلی گرم ۲ تا ۳ بار در روز

شروع درمان باید با در نظر گرفتن مصرف اخیر داروهای ضد فشار خون، مقدار افزایش یافته فشار خون و محدودیت مصرف نمک باشد.

تنظیم دوز: اگر کاهش فشار خون مورد نظر طی یک تا دو هفته اتفاق نیفتد، دوز دارو می بایست به ۵۰ میلی گرم دو تا سه بار در روز افزایش پیدا کند. اگر کاهش فشارخون بیشتری بعد از اضافه کردن یک داروی دیورتیک مورد نظر می باشد، دوز کاپتوپریل می تواند به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی گرم دو تا سه بار در روز افزایش پیدا کند.

نارسایی بطن چپ پس از سکته قلبی:

دوز معمول: ۵۰ میلی گرم سه بار در روز می باشد.

دوز شروع: بعد از دادن یک دوز ۶/۲۵ میلی گرم، شروع یا دوز ۱۲/۵ میلی گرم سه بار در روز صورت می گیرد. درمان می تواند تا سه روز بعد از سکته قلبی شروع شود.^(۱)

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک شخص دیده نمی شود.

عوارضی که در صورت بروز آنها باید به پزشک مراجعه کرد: افت فشار خون همراه با سرگیجه، احساس سبکی در سر یا غش کردن، راش پوستی، تب، درد مفاصل

عوارضی که در صورت تداوم آنها باید با پزشک مشورت کرد: سرفه خشک و پایدار، سردرد، اسهال، اختلالات چشایی، تهوع، خستگی^(۳)

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری دارو:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت شرکت داروسازی اکسیر - ایران

References:

- 1) Drug facts and comparisons 2015 volume 1 page 924
- 2) Lexicomp Drug information handbook (APHA) 23rd edition page: 337
- 3) USPDI, Drug information for the health care professional 27th edition 2007, volume 1, page: 206



2205050/2

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:
تلفن گویا: ۰۲۱ - ۸۸۹۱۰۹۱۰
ایمیل: exir_cc@exir.co.ir
وبسایت: www.exir.co.ir

EXIR 31 05 95
145 x 100 mm
364 U
138 U