

GEFAZOLIN-EXIR Cefazolin

سفازولین - اکسیر سفازولین

مشخصات دارو:

ویال های تولیدی شرکت داروسازی اکسیر به صورت پودر برای تهیه محلول های تزریقی حاوی ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم سفازولین (به صورت سفازولین سدیم) در بسته بندی ۱۲ عددی به همراه برکه راهنما به بازار عرضه می شود.

دسته دارویی:

آنتی بیوتیک سفالوسپورین نسل اول.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

۱. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

– در صورت وجود سابقه حساسیت به هریک از سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها یا هر نوع دارو، غذا و یا مواد دیگر.

– در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر.

– در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی، سابقه تشنج، سابقه بیماری های معده و روده به ویژه کولیت (از جمله کولیت ناشی از دارو) یا التهاب روده کوچک.

۲. دارو را در فواصل زمانی معین طبق دستور پزشک مصرف و دوره درمان را کامل کنید.

۳. اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوری آن را مصرف کنید اما اگر زمان نوبت بعدی تقریباً فرارسیده باشد از نوبت فراموش شده صرف نظر کنید و دوز مصرفی را دو برابر نکنید.^(۲)

موارد منع مصرف:

حساسیت به سفازولین یا سایر سفالوسپورین ها.^(۱)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

– مصرف این دارو در دوران بارداری در رده B می باشد و تجویز آن تحت نظر پزشک بر اساس سود و زیان مادر و جنین می باشد.

– سفازولین به مقدار کم، در شیر مادر ترشح می شود و تجویز آن با احتیاط و تحت نظر پزشک بر اساس سود و زیان مادر و نوزاد می باشد.^(۱)

هشدارها و موارد احتیاط:

– این دارو ممکن است موجب نتایج غلط در اندازه گیری قند ادرار شود.

– اگر طی چند روز از شروع درمان، علائم بیماری کاهش نیافت به پزشک خود اطلاع دهید.

– در مصرف طولانی مدت این دارو ریسک ابتلا به عفونت کلوستریدیوم دیفیسیل وجود دارد لذا در صورت بروز اسهال شدید و مقاوم حتی پس از پایان دوره درمان، فوراً پزشک خود را مطلع سازید.

– در بیماران با سابقه حساسیت به پنی سیلین ها با احتیاط مصرف شود.

– این دارو ممکن است ریسک بروز تشنج را افزایش دهد، در صورت سابقه تشنج، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.^(۱۳)

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر یا سایر داروها پزشک خود را مطلع سازید:

فنی توئین، فس فسفونین، آنتاگونیست های ویتامین K، پروبنسید، واکسن تیفوئید، ب ث ژ، سدیم پیکوسولفات.^(۱)

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و نحوه مصرف دارو توسط پزشک مشخص می شود اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

– کودکان بالای یک ماه: ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم روزانه هر ۶ تا ۸ ساعت (۳ تا ۴ دوز منقسم)، ماکزیمم دوز ۶ گرم روزانه می باشد.

– بزرگسالان: ۲۵۰ تا ۱۵۰۰ میلی گرم هر ۶ تا ۱۲ ساعت (معمولاً هر ۸ ساعت)، ماکزیمم دوز ۱۲ گرم روزانه می باشد.^(۱)

– نحوه آماده سازی جهت تزریق عضلانی:

محتویات ویال سفازولین ۵۰۰ میلی گرم و ۱ گرم را به ترتیب در ۲ و ۲/۵ میلی لیتر آب استریل برای تزریق به خوبی حل کنید و به صورت عمیق عضلانی تزریق کنید.

– نحوه آماده سازی جهت تزریق وریدی:

محتویات ویال سفازولین ۵۰۰ میلی گرم و ۱ گرم را به ترتیب در ۲ و ۲/۵ میلی لیتر آب استریل برای تزریق، به خوبی حل کنید سپس محلول تهیه شده را با ۵ میلی لیتر آب استریل برای تزریق رقیق کرده و دوز مناسب را طی ۳ تا ۵ دقیقه به صورت مستقیم در داخل ورید تزریق نمایید.

– نحوه آماده سازی جهت انفوزیون وریدی:

محتویات ویال سفازولین ۵۰۰ میلی گرم و ۱ گرم را به ترتیب در ۲ و ۲/۵ میلی لیتر آب استریل برای تزریق، به خوبی حل کنید سپس محلول تهیه شده را با ۵ تا ۱۰۰ میلی لیتر محلول های

انفوزیون کلرور سدیم ۰/۹% و دکستروز ۵% رقیق کرده و طی ۳۰ تا ۶۰ دقیقه انفوزیون نمایید.^(۳)

• توجه: پس از افزودن محلول، ویال را به خوبی تکان دهید. در صورت مشاهده ذرات یا شفاف نبودن محلول یا هرگونه تغییری از تزریق خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک شخص دیده نمی شود؛ لذا در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

– عوارض شایع تر:

مدفوع سیاه و قهوه ای، درد قفسه سینه، احساس سرما و لرز، سرخه، تب، ادرار دردناک، تنگی نفس، گلو درد، زخم یا نقاط سفید رنگ بر روی لب ها یا در دهان، تورم غدد لنفاوی، خونریزی یا کبودی

غیر عادی، خستگی و ضعف.

– عوارض یا شیوع کمتر:

درد شدید معده یا شکم، حساسیت شکم به لمس، تهوع، اسهال، کهیر، خارش و سرخی پوست، راش پوستی، جدا شدن لایه پوست، سرخی و تورم در محل تزریق، تشنج.

• توجه: بعضی از این عوارض ممکن است تا چند هفته پس از پایان مصرف دارو رخ دهند.

– گروهی دیگر از عوارض معمولاً خود به خود مرتفع می شوند، در صورت تداوم و یا مزاحمت این عوارض به پزشک خود اطلاع دهید:

اسهال خفیف، سردرد، کرامپ معدی خفیف، خارش یا ترشح واژن.^(۲)

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنید. **شرایط نگهداری:**

– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمایید.

– از مصرف و نگهداری داروی تاریخ مصرف گذشته جداً خودداری کنید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

References:

1-Lexicomp Drug information handbook, 2015, 23rd edition, Pages: 366-368

2-USPDI, Advice for the Patient Drug Information in Lay language, 2007, 27th edition, volume 1, Pages: 361-366

3-AHFS Drug information, 2010, Pages:107-111



2205185/5

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:

تلفن (گویا): ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰
ایمیل: exir_cc@exir.co.ir
وبسایت: www.exir.co.ir

W*L: 100*145
260 U
348 U