

(آمپول ۱۰۰۰ میکروگرم)

راهنمایهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه و یا تجویز آن برای دیگران خودداری کنید.

۱) قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود در موارد زیر مشورت کنید:

- در صورت ابتلا به هرگونه بیماری دیگر به ویژه بیماری لبر (تحلیل رفتگی مادرزادی عصب بینایی) و نقص بینایی ناشی از مصرف توتون.

- در صورت ساقمه حساسیت به ویتامین ۱۲ بیا هر نوع دارو یا ماده دیگر.

- در صورت استفاده از هر نوع دارو یا مکمل غذایی دیگر و یا داشتن رژیمهای غذایی خاص مثل گیاه خواری.

۲) درباره لزوم استفاده و مقدار استفاده از مواد غذایی حاوی ویتامین ۱۲ (مانند: گوشت، جگر، قلوه، شیر، تخم مرغ، لبیات و ماهی) با پزشک خود مشورت کنید.

۳) اگر آمپول ۱۲ بیا به دلیل عدم جذب شکل خوارکی آن برای شما تجویز شده است در مورد طول مدت درمان از پزشک خود راهنمایی بگیرید و بدون نظر پزشک دارو راحتی در صورت احساس بهبود قطع نکنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

صرف مقادیر لازم ویتامین ۱۲ (که توسط پزشک تعیین می شود) در دوران بارداری و شیردهی برای رشد طبیعی جنین و نوزاد ضروری است، بویژه در مادرانی که فقط از غذاهای گیاهی استفاده می کنند. در عین حال مصرف بیش از حد این ویتامین در این دوران برای مادر و نوزاد مضر است.

هشدارها:

۱) مصرف این فرآورده بدون تجویز پزشک ممنوع است.

۲) از تزریق این دارو بصورت وریدی خودداری کنید.

۳) در بیمارانیکه به کوبالامین ها حساسیت دارند باید تست داخل جلدی صورت گیرد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند. بهر حال مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است: در درمان کم خونی پرنیسیوز و دیگر کم خونهای ماکروسیتیک - بدون درگیری اعصاب، ۲۵۰ میکروگرم یک روز در میان بصورت عضلانی به مدت ۱ تا ۲ هفته و سپس ۲۵۰ میکروگرم هر هفته تا طبیعی شدن و ضعیت خون تجویز می شود. مقدار نگهدارنده ماهانه ۱۰۰۰ میکروگرم تجویز می شود. در صورت درگیری نورولوژیک ۱۰۰۰ میکروگرم یک روز در میان تا حصول بهبودی تجویز می شود.

در پیشگیری از بروز کم خونی ناشی از کمبود ویتامین ۱۲ متعاقب برداشت معده یا سو، جذب به مقدار ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میکروگرم ماهانه بصورت عضلانی تزریق می شود.

عوارض جانبی:

در صورت بروز هر کی از عوارض ذیل که بندرت در بعضی افراد ممکن است روی دهد فوراً به پزشک اطلاع دهید: خارش، بثورات پوستی، خس در هنگام تنفس (صدای سوت مانند تنفس)، تنگی نفس، اشکال در بینایی، احساس تورم بدن، اسهال (در صورت تحمل ناذیری و طولانی بودن) و نیز در صورت بروز هر نوع عارضه احتمالی دیگر با پزشک خود مشورت کنید.

مسئومیت:

در صورت مصرف مقادیر بیش از حد معمول با پزشک خود تماس بگیرید.

شرایط نگهداری و توجهات عمومی:

در های کمتر از ۱۳ درجه سانتیگراد دور از نور نگهداری کنید.

● از دسترس کودکان دور نگهدارید.

● از نگهداری و مصرف داروهایی که تاریخ مصروف شان سرسیده خودداری کنید.

● از يخ زدگی محافظت شود.

اشکال دارویی:

آمپول یک میلی لیتری و در بسته های ۱۰ عددی.



2205223/IR1