

# دکسترومتورفان

شربت خوارکی ۱۵ میلی گرم در هر ۵ میلی لیتر

## DEXTROMETORPHAN

SYR 15mg / 5ml

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

### دسته دارویی:

ضد سرفه غیر اپیوتیدی

### راهنمایی های عمومی:

- در صورت داشتن سرفه های مزن و پایدار یا سرفه های همراه با ترشحات زیاد، قبل از مصرف حتماً با پزشک مشورت نمایید.
- اگر بعد از یک هفته مصرف دارو بهبودی در روند سرفه ایجاد نشود یا سرفه ها تکرار شود باید با پزشک مشورت نمایید.
- این دارو برای کودکان زیر ۲ سال توصیه نمی شود.

### موارد منع مصرف:

حساسیت به دکسترومتورفان یا سایر اجزای فرآورده:  
صرف این دارو در دوران بارداری در گروه C قراردارد.

ترشح دارو در شیر نامشخص است، در خانم های شیرده با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف شود.

### هشدارها و موارد احتیاط:

- در صورت وجود سرفه های مزن و مداوم مانند سرفه های ناشی از سیگار کشیدن، آسم یا سرفه های ناشی از افزایش ترشحات موكوزی این دارو نباید استفاده شود.
- در صورتی که سرفه بیش از ۷ روز طول بکشد یا سرفه همراه با تب، راش یا سردرد مزن باشد باید با پزشک مشورت شود.
- موارد نادری از سوء مصرف فرآورده های حاوی دکسترومتورفان خصوصاً در میان نوجوانان گزارش شده است.

### تداخلات دارویی:

- داروهای کینینین، سیبوتامین، مهار کننده های مونوآمینواکسیداز مثل سلزیلین، تراپیل سیپرومهین و ... با این دارو تداخل دارند، این تداخل ممکن است تا دو هفته پس از قطع مهار کننده های مونوآمینواکسیداز اتفاق افتد.

### مقادار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقادار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما مقدار مصرف این دارو به شرح ذیل می باشد:  
افراد بالای ۱۲ سال: ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم هر ۴ ساعت یا ۳۰ میلی گرم هر ۶ تا ۸ ساعت حداقل تا ۱۲۰ میلی گرم در روز  
۶ تا ۱۲ سال: ۱۵ میلی گرم هر ۶ تا ۸ ساعت حداقل تا ۶۰ میلی گرم در روز  
۲ تا ۶ سال: ۷/۵ میلی گرم هر ۶ تا ۸ ساعت حداقل تا ۳۰ میلی گرم در روز

### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک شخص دیده نمی شود.

عوارض جانبی ممکن است شامل گیجی، خواب آلودگی و ناراحتی های گوارشی باشد.

### مسموهیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

### شروط نگهداری و توصیه های عمومی:

- در دمای کمتر از ۲۵ یا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.



2205394/3

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:  
تلفن گویا: ۰۱۰-۸۸۹۱۰۹۱  
exir\_cc@exir.co.ir  
www.exir.co.ir