

DIABETOSE®

دیابتوز®

Sitagliptin Tablet

قرص سیتاگلیپتین

این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری کنید.

اشکال دارویی و بسته بندی:

دیابتوز® ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم تولیدی شرکت اکسیر به صورت قرص خوارکی روکشدار در جعبه های ۳۰ عددی (هر جعبه حاوی ۳ بیسیتر ۱۰ عددی به همراه بروشور) به بازار عرضه می گردد.

دسته دارویی:

ضد دیابت (مهار کننده دی پپتیدیل پپتیداز)

راهنمایی های عمومی:

صرف در کودکان و سالمندان: بی خطری و کار آبی این دارو در کودکان اثبات نشده است مصرف این دارو در سالمندان با احتیاط صورت گیرد.^(۱)

موارد منع مصرف:

حساسیت (از قبیل آنفیلکسی یا آنزیوادم) به سیتاگلیپتین یا هر یک از اجزای فرآورده^(۱)

صرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری در گروه B قرار دارد. با این وجود مصرف مهار کننده های دی پپتیدیل پپتیداز (DPP-IV) در زنان باردار به طور رایج توصیه نمی شود.^(۱)

ترشح این دارو در شیر نامشخص است؛ لذا مصرف آن در خانم های شیرده می باشد با احتیاط صورت گیرد.^(۱)

شدادرها و موارد احتیاط:

- در صورت بروز واکنش های حساسیتی جدی (از قبیل آنفیلکسی، آنزیوادم...) مصرف دارو قطع شود.

- در بیماران مبتلا به نقص عملکرد کلیوی متوسط یا شدید و بر بیماران با ESRD (بیماران کلیوی در مراحل انتهایی) که نیازمند به همودیالیز یا دیالیز پریونتال هستند، نیاز به تنظیم دوزات می باشد.

- گزارشاتی مبنی بر بروز پانکراتیت حاد با این دارو موجود است. بنابراین بعد از شروع درمان، بیمار به دقت از لحاظ نشانه های پانکراتیت پایش شود.

- دارو را می توان همراه با غذا یا با فاصله از آن میل کنید.^(۱)

تداخلات دارویی:

سیتاگلیپتین ممکن است اثرات مهار کننده های آنزیم میدل آنژیوتانسین، دیکوکسین و داروهای هیپوگلایسمیک (مانند انسولین و همچنین سولفونیل اوره ها مثل گلی بنکلامید) را افزایش دهد. بنابراین در مصرف هم زمان این دارو با یک داروی سولفونیل اوره و یا انسولین، جهت کاهش خطر هیپوگلایسمی (قدن خون پایین) ممکن است مقدار کمتری از داروی سولفونیل اوره و یا انسولین مورد نیاز باشد.^(۱)

از مصرف هم زمان این دارو با مهار کننده های MAO، سالیسیلات ها، مهار کننده های انتخابی باز جذب سروتونین، پگ و بیزومات، مهار کننده ها و القاگننده های گلیکوپروتئین P، کورتیکو استروئیدها، دیورتیک های لوب، آنالوگ های آزاد کننده LH، سوماترопین و دیورتیک های تیازیدی بپرهیزید.^(۱)

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان: ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز

کودکان: بی خطری و کار آبی این دارو در کودکان ثابت نشده است.^(۱)

در بیمارانی با تاریخی کلیوی نیاز به تنظیم و کاهش دوز می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بحرخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد

دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیبر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض گوارشی (درد شکم، بیوست، اسهال، تهوع، استفراغ)

واکنش های حساسیتی (آنفیلکسی، آنزیوادم و واکنش های آفیزیش حساسیت، راش، خلرشن)

متابولیک (پانکراتیت حاد، هایپوگلایسمی)

اسکلتی عضلانی (درد مفاصل، کمردرد، درد عضلات، درد دراندام انتهایی)

نفسی (سرقه، نازوفارنیزیت، سینوزیت، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی)
قلبي عروقی (آدم محیطی)^(۱)

سمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سلسیو گرد و دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

ساخت شرکت داروسازی اکسیر - ایران

Reference:

1. Drug facts and comparisons 2015, volume 1 , pages: 531 - 533

2. Lexicomp drug information hand book (Apha) 3rd edition 2015 , pages: 1927 - 1928

راه های تماس با شرکت واراکه هرگونه پیشنهاد یا شکایت :

تلفن گویا : ۰۱۶ - ۸۸۹۱۰۹۰

ایمیل : exir_cc @ exir . co . ir

وب سایت : www . exir . co . ir



2205692 / IR2