

# دیگلوفاک سدیم دیگلورن<sup>®</sup>

## Diclofenac Sodium DICLOREN<sup>®</sup>

### مشخصات دارو:

دیگلورن<sup>®</sup> شرکت داروسازی اکسیر به صورت قرص های پیوسته رهش حاوی ۱۰۰ میلی گرم دیکلوفاک سدیم در بسته بندی های ۳۰ و ۱۰۰ عددی و آمپول های ۳ میلی لیتری حاوی ۷۵ میلی گرم دیکلوفاک سدیم در هر آمپول که به صورت ۱۰ عددی به همراه برگه راهنما به بازار عرضه می گردد.

### دسته دارویی:

ضد التهاب غیر استروئیدی NSAID<sup>(۱)</sup>

### راهنمای های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

- ۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:
  - در صورت حساسیت به دیکلوفاک و یا سایر اجزای موجود در فرمولاسیون
  - در صورت سابقه هرگونه واکنش حساسیتی پس از مصرف آسپرین و سایر دارو های گروه NSAIDs
  - در صورت ابتلا به بیماری های مزمن نظیر کم خونی یا آسم، نارسایی احتقانی قلب و فشار خون، نارسایی کلیوی، اعتیاد به الکل، مصرف سیگار، اپوپس اریتماتوز سیستمیک، زخم معده یا بیماری های دستگاه گوارش، حیابت، هموفیلی، سیروز کبدی، نارسایی کبدی، پورفیری، همورژی، آرتريت تصوراتی، پارکینسون
- ۲- در صورت محدودیت مصرف سدیم دارو و یا مطلق دستور پزشک مصرف کنید.
- ۳- اگر گرگ نوبت از مصرف دارو را فراموش کرده باشید یا مصرف یادآوری آن را استفاده نمایید اما اگر زمان نوبت بعدی تقریباً فرا رسیده باشد از نوبت فراموشی شده صرف نظر کنید و دوز مصرفی را دو برابر نکنید.
- ۴- در صورت درمان طولانی مدت به طور مرتب با پزشک در ارتباط باشید.<sup>(۲)</sup>

### موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به دیکلوفاک و سایر اجزا فرمولاسیون
- در صورت بروز آسم و کبیر یا سایر واکنش های حساسیتی پس از مصرف آسپرین و یا سایر دارو های NSAID<sup>(۱)</sup>
- سه ماهه سوم بارداری<sup>(۲)</sup>

### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- مصرف دیکلوفاک در سه ماهه اول و دوم بارداری در گروه C قرار دارد لذا مصرف آن در این دوران توصیه نمی شود. در سه ماهه سوم بارداری نیز در گروه D قرار گرفته لذا در این دوران منع مصرف دارد.
- دیکلوفاک به مقدار کم در شیر ترشح می شود لذا مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.<sup>(۲)</sup>

### هشدارها و موارد احتیاط:

- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی و بیمارانی که در معرض عمل جراحی CABG قرار دارند خطر سکته و انفارکتوس میوکارد را افزایش می دهد.
- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی، مصرف هم زمان آسپرین، داروهای ضد انعقاد و کورتیکواستروئیدها خطر بروز خونریزی را افزایش می دهد.
- مصرف این دارو به علت احتمال بروز واکنش های حساسیت به نور، عوارض شدید پوستی، سندرم استیون جانسون و نیز واکنش های شوک آنافیلاکسی می باشد با احتیاط کامل صورت گیرد.
- از تزریق وریدی آمپول دیکلوفاک سدیم اکیداً خودداری کنید.
- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (از جمله جراحی دندانپزشکی) پزشک یا دندانپزشک خود را از مصرف این دارو آگاه کنید.
- این دارو در بعضی بیماران ممکن است سبب گیجی، خواب آلودگی یا تاری دید شود. قبل از رانندگی، کار یا ماشین آلت یا هرگونه فعالیت دیگری که نیاز به هوشیاری و دید کامل دارد از عدم بروز این عوارض مطمئن شوید.
- در صورت بروز علائم مانند خارش، راش، اختلال بینایی، وزوز گوش، افزایش وزن، ادم، تیرگی رنگ مدفوع یا سردرد مقاوم به درمان، درد معده، استفراغ فونی و درد قفسه سینه پزشک خود را مطلع سازید.

\*Coronary artery bypass graft

- فشار خون و سطح قند خون بیمار به طور متناوب اندازه گیری شود.
- بروز علائم خونریزی در بیمار می بایست تحت کنترل قرار گیرد.
- از شکست، خرد کردن و جویدن قرص های دیکلوفاک خودداری فرمایید.<sup>(۳)</sup>
- با توجه به عوارض تزریق عضلانی دارو از جمله بروز احتمالی فاج یا، دکروز، آبسه و درد در محل تزریق در کودکان زیر ۱۵ سال به هیچ عنوان تزریق این دارو توصیه نمی شود و در بالین لازم است که تزریق عضلانی به صورت عمیق و در عضله سرینی صورت گیرد.

### تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر یا سایر داروهای پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای ضد انعقاد و پلاکت، سایر NSAIDs، آمینوگلیکوزیدها، دایکاتران اکسیلات، متوروکسات، ریواروکسابان<sup>(۴)</sup>

### مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

- خوردگی:
- آرتريت روماتوئید: ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز، حداکثر مقدار مصرفی ۲۰۰ میلی گرم در روز در دو دوز متقسم
- استئوآرتريت: ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز
- قرص های دیکلوفاک را همراه یک لیوان پر از آب میل نمایید و حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه پس از مصرف دراز نکشید.
- به منظور کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه غذا یا شیر میل کنید.<sup>(۲)</sup>
- قرص تزریقی:
- دارو بسته به نیاز بیمار و صرفاً با توصیه پزشک تجویز می شود.

### عوارض جانبی:

هر دارو به موازت اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر یا غیر از آن چه در برگه راهنما ذکر شده است با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

ادم، سردرد، گیجی، راش و خارش پوستی درد شکم، یبوست، اسهال، اولسر پپتیک، توع و استفراغ، آرمی، افزایش مدت زمان خونریزی، اختلال آتیم های کبدی

سایر عوارض نادر که تهدید کننده حیات هستند عبارتند از:

آکروانوسیتوزیس، واکنش های آنافیلاکسی، آنژیوادم، اضطراب، کم خونی آپلاستیک، تغییر در اشتها، آریتمی، مننژیت استپتیک، آسم، درد قفسه سینه، تاری دید، انفارکتوس میوکارد، رتیکو، واسکولیت، تغییر در وزن، ضعف و خستگی، پنومونی، سندرم فزوتیک، سندرم استیون جانسون، اختلال در حافظه<sup>(۲)</sup>

### مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

### شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- قرص ها را در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد)، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- آمپول ها را در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد)، دور از نور در داخل جعبه نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

## For Hospital Use Only

## این دارو بیمارستانی است

### References:

- 1-USPDI, Advice for the Patient Drug Information in Lay language, 2007, 27<sup>th</sup> edition, volume1 Pages: 164-174
- 2-Lexicomp Drug information handbook, 2015, 23<sup>rd</sup> edition, Pages : 609-612



راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:  
تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰  
ایمیل: [enr\\_oc@enr.oc.ir](mailto:enr_oc@enr.oc.ir)  
وب سایت: [www.enr.oc.ir](http://www.enr.oc.ir)

2205243 / 183

EXIR 98.07.15  
W\*L: 100\*145  
DARK BLUE U  
021 U 185 U