

راهنماییهای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و با توصیه به دیگران خودداری نمایید. جنتامایسین از دسته داروهای آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی است.

این دارو بر روی پاسیل های هوایی گرم منفی و تعدادی از میکرو ارگانیسم های گرم مثبت مؤثر است. فعالیت ضد میکروبی آمینوگلیکوزیدها بیشتر بر روی گروه انتروپاکتریاسه شامل اشتریشیاکولی، پروتئوس (ایندول مثبت و ایندول منفی)، سیتروباکتر، انتروباکتر، کلیسیلا و گونه های پرورویستیسا و سر اپیا می باشد.

جذب خوراکی این دارو ضعیف است.

از آ JACK کد دفعه این دسته از داروهای راه کلیه می باشد، در صورت سابقه بیماریهای کلیوی پزشک خود را مطلع نمایید.

دارو را طبق برنامه تجویز شده و بطور کامل مصرف نمایید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

در صورت وجود کدورت یا تغییر رنگ از مصرف دارو خودداری نمایید.

بخاطر تشکیل کمپلکس با سیاری از داروها، مخلوط کردن آن با سایر داروها توصیه نمی شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در دوران بارداری در گروه C قرار می گیرد لذا سود و زیان مصرف آن در این دوره باید توسط پزشک متخصص ارزیابی گردد.

آمینو گلیکوزیدها از حفت عبور می نمایند.

ترشح آن در شیر ضعیف و جذب خوراکی آن ناچیز است.

هشدارها:

این دارو ممکن است سبب مسمومیت شنوانی یا کلیوی گردد.

در صورت بروز سمتی شنوانی یا کلیوی قطع مصرف با تنظیم وزن مصرفی توسط پزشک الزامی است.

بررسی اودیوگرام، سنجش کار کلیه و دهیلیز گوش قبل از درمان، در طول درمان و پس از درمان در بیمار اینیکه عیب کار کلیه یا عیب کار عصب هشتم دارد و یا افراد مسن ممکن است ضروری باشد.

بیمار اینیکه نسبت به یکی از آمینو گلیکوزیدها عدم تحمل نشان می دهدن ممکن است سایر آمینو گلیکوزیدها را نیز تحمل نکنند.

اندازه گیری غلظت آمینو گلیکوزیدهای سرمه بخصوص در نوزادان و سالخوردها و بیماران مبتلا به عیب کار کلیه الزامی است.

در صورت مشاهده ذرات داخل آمپول از تزریق خودداری گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

در بالغین: ۱ /۷ mg/kg - ۱ هر ۸ ساعت از راه تزریق عفنلائی یا انفوزیون و ریزیدی به مدت ۱ - ۷ روز یا بیشتر.

در عفونتهای ساده دستگاه ادراری در بالغین با وزن کمتر از ۴ کیلوگرم، ۳ mg/kg یکبار در روز و یا در دو دوز منقسم و در بالغین بالای ۶ کیلوگرم ۱۶۰ میلی گرم، یکبار در روز و یا در دو دوز منقسم.

در نوزادان و کودکان:

در نوزادان نارس یا طبیعی تا سن یک هفته: ۲/۵ mg/kg - ۲ هر ۱۲ تا ۲۴ ساعت به مدت ۱ - ۷ روز یا بیشتر.

در نوزادان بزرگتر و شیرخواران: ۲/۵ mg/kg - ۱ هر ۸ ساعت به مدت ۱ - ۷ روز یا بیشتر.

در کودکان: ۲/۵ mg/kg - ۲ - ۴ هر ۸ ساعت به مدت ۱ - ۷ روز یا بیشتر.

عوارض جانبی:

هر دارو به موارد اثر درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته بشود. اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز مزاحمت هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

هرگونه کاهش شنوانی، زنگ زدن یا مهمه در گوش یا احساس پر بودن گوش (مسمومیت شنوانی)، وجود خون در ادرار، کاهش یا افزایش شدید مقدار یا تعداد دفعات دفع ادرار، کاهش اشتها یا تشنگی غیر عادی (مسمومیت کلیوی)، از دست دادن مهارت در انجام کارها یا بی ثباتی و سرگیجه (مسمومیت دهیلیزی)، تهوع و استفراغ (مسمومیت دهیلیزی و مسمومیت کلیوی)، بی حسی، گزگر کردن و پرش عفنلائی یا تشنج.

عوارض با شیوع کمتر:

بثورات جلدی، خارش، قرمزی یا تورم پوست.

عوارض نادر:

اشکال در تنفس، خواب آلودگی یا ضعف.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک، بیمار بایستی به بیمارستان منتقل گردد.

شرط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری گردد.

- از بخ زدگی محافظت گردد.

اشکال دارویی:

آمپولها و ویال های ۸۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر، ۴۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر و ۲۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر.

