

کتورولاک



KETOROLAC

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمائید.

دسته دارویی:

ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs)

موارد مصرف دارو:

جهت کنترل کوتاه مدت (حداکثر ۵ روز) دردهای نسبتاً شدید و حاد که نیاز به مسکن هایی در سطح داروهای مخدر دارند، بعد از اعمال جراحی، رنال کولیک حاد، درد بیماران سرطانی و موارد ارتوپدیک استفاده می شود. لازم به ذکر است که این دارو در تسکین دردهای مزمن و خفیف کاربرد ندارد.

راهتمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱) مصرف این دارو ممکن است باعث بروز حساسیت شود؛ در صورت حساسیت بیمار به رنگها، مواد نگهدارنده و نیز حساسیت به داروها از جمله استامینوفن و داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) (نظیر ایبوپروفن، دیکلوفناک، ایندومتاسین، پیروکسیکام و ...) از تجویز این دارو خودداری نمائید.

۲) این دارو در بیماران با سابقه نارسایی قلبی، فشار خون بالا، بیماریهای عروقی و ادم، دیابت و هموفیلی با احتیاط و تحت کنترل کامل وضعیت بیمار مصرف شود.

۳) این دارو ممکن است باعث ایجاد ناراحتی های گوارشی شود لذا در صورت ابتلا بیمار به کولیت و یا زخم و خونریزی گوارشی از تجویز دارو خودداری نمائید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

– مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در بارداری جز، گروه C می باشد. لذا مزایای مصرف این دارو نسبت به مضرات مصرف آن باید سنجیده شود. توجه شود که مصرف این دارو در هنگام زایمان ممنوع است چرا که می تواند بر گردش خون جنین اثر سو، گذاشته و سبب مهار انقباضات رحمی شود.

– مصرف در شیردهی:

مصرف کتورولاک ترومتامول در شیردهی ممنوع است چرا که ممکن است سبب بروز عوارض ناخواسته ای در نوزاد شیرخوار گردد.

هشدارها:

۱) مصرف این دارو ممکن است باعث گیجی و خواب آلودگی شود؛ لذا در صورت مصرف این دارو، بیمار از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمائید.

۲) از تجویز همزمان این دارو با سایر داروهای NSAIDs (از قبیل دیکلوفناک، ایندومتاسین و ...) و استامینوفن اجتناب کنید.

۳) این دارو در بیماران مبتلا به پورفیری حاد باید با احتیاط مصرف شود.

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو برای تسکین دردهای متوسط تا شدید و حاد بصورت تزریقی عضلانی یا وریدی تجویز می شود. این دارو به دو صورت تک دوز و چند دوز تجویز شده که مقدار مصرف آن براساس روش تجویز و سن بیمار به قرار زیر است:

۱ – تجویز دارو به صورت تک دوز:

الف) بیماران با سن کمتر از ۶۵ سال: تک دوز دارو به مقدار ۶۰ mg بصورت عضلانی یا ۳۰ mg بصورت وریدی حداقل در مدت ۱۵ ثانیه تزریقی می شود.

ب) بیماران با سن بیشتر از ۶۵ سال، افراد با وزن کمتر از ۵۰ kg و افراد مبتلا به نارسایی کلیوی: تک دوز دارو به مقدار ۳۰ mg بصورت عضلانی یا ۱۵ mg بصورت وریدی حداقل در مدت ۱۵ ثانیه تزریقی می شود.

ج) اطفال ۱۶ – ۲ سال: تک دوز دارو به مقدار ۱ mg/kg (ماکزیم ۳۰ mg) به صورت عضلانی یا ۰/۵ mg/kg (ماکزیم ۱۵ mg) بصورت وریدی حداقل در مدت ۱۵ ثانیه تزریقی می شود.

۲) تجویز دارو به صورت چند دوز:

الف) بیماران با سن کمتر از ۶۵ سال: در این بیماران ۳۰ mg کتورولاک بصورت عضلانی یا وریدی حداقل در مدت ۱۵ ثانیه هر ۶ ساعت تجویز می شود. (میزان مصرف روزانه دارو نباید بیش از ۱۲۰ mg باشد).

ب) بیماران با سن بیشتر از ۶۵ سال، افراد با وزن کمتر از ۵۰ kg و افراد مبتلا به نارسایی کلیوی: در این بیماران ۱۵ mg کتورولاک به صورت عضلانی یا وریدی حداقل در مدت ۱۵ ثانیه هر ۶ ساعت تجویز می شود. (میزان مصرف روزانه دارو در این افراد نباید بیشتر از ۶۰ mg باشد).

توجه: مصرف این دارو تحت نظارت پزشک مجاز می باشد.

موارد منع مصرف:

این دارو در موارد زیر منع مصرف دارد:

۱) سابقه حساسیت به آسپرین یا سایر داروهای NSAIDs که می تواند شامل آسم، آنژیوادم، کهیر و رینیت باشد.

۲) بیماریهای انعقادی

۳) بیماریهای قلبی – عروقی از قبیل نارسایی قلب، بیماریهای ایسکمیک قلب، اختلالات عروقی مغز و اختلال شریانهای محیطی.

۴) مبتلایان و سابقه ابتلا، بیمار به زخم های گوارشی و خونریزی دستگاه گوارش.

۵) علائم شدید یا خفیف پولیپ بینی.

۶) بیماران دارای نارسایی کلیوی و یا کبدی شدید و بیماران مبتلا به فشار خون بالا.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات آثار درمانی مطلوب ممکن است باعث عوارض جانبی ناخواسته ای نیز شود. در صورت بروز هر کدام از اثرات جانبی که در زیر ذکر شده و هر نوع عارضه دیگری که در این برکه راهنما ذکر نشده است به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

۱) عوارض جانبی بسیار شایع:

سر درد، درد شکم و معده، سوء هاضمه، تبوع

۲) عوارض جانبی شایع:

ادم، افزایش فشار خون، احساس گیجی، خارش، راش پوستی، کبودی پوست، اسهال، یبوست، احساس نفخ و سیری، خونریزی دستگاه گوارش، احساس سوزش سردل، استفراغ، آتمی، افزایش آنزیم های کبدی، درد در محل تزریق، وزوز گوش، اختلال عملکرد کلیوی، افزایش تعریق

۳) عوارض جانبی نادر:

واکنش آنافیلاکتیک، آریتمی، آسم، درد در قفسه سینه، تب، سندرم استیو جانسون، اختلالات تنفسی، توهم، افسردگی، سرفه، تاری دید، بی خوابی، افزایش وزن، حساسیت به نور، اررار کردن مشکل و دردناک

تداخلات:

از تجویز همزمان این دارو با داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs)، مهار کننده های آنزیم میحل آنژیوتانسین (ACEIs)، مهار کننده های گیرنده آنژیوتانسین (ARIs)، داروهای ضد انعقاد و ترومبولیتیک، لیتیم، پروپینسید، پنتوکسی-فیلین، متوترکسات، داروهای دیورتیک و الکل خودداری نمائید.

مسمومیت:

در صورت بروز مسمومیت می بایست براساس پروتکل درمانی مسمومیت با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) اقدامات لازم را انجام داد.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و بخ زدگی نگهداری کنید.

بسته بندی:

کتورولاک به صورت آمپولهای یک میلی لیتری حاوی ۳۰ میلی گرم کتورولاک ترومتامول در هر میلی لیتر و در بسته بندی ۱۰ عددی توسط شرکت داروسازی اکسیر ساخته می شود.

ساخت شرکت داروسازی اکسیر – ایران

References:

United state pharmacopeia Drug information (27th edition), pages: 951 - 956

Drug fact and comparisons 2010, pages: 1262 - 1263

British National formulary 60, pages: 620, 621, 774

AHFS Drug information 2010, pages: 2123 - 2130

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:

تلفن گویا: ۰۲۱ - ۸۸۹۱۰۹۱۰

ایمیل: exir_cc@exir.co.ir

وبسایت: www.exir.co.ir



2205704/2