

# HYDROXYZINE – EXIR

## Hydoxizine Syrup 10mg/5ml

هیدروکسی زین - اکسیر  
شربت هیدروکسی زین ۱۰ mg/۵ml

### مشخصات دارو:

شربت هیدروکسی زین ۱۰ mg/۵ml شرکت داروسازی اکسیر با حجم ۱۲۰ میلی لیتر در هر بطری، همراه با پیمانه و برگه راهنما به بازار عرضه می شود.

### دسته دارویی:

آنتاگونیست هیستامین H1، مشتق پیریدین<sup>(۱)</sup>

### راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

- در صورت حساسیت به هیدروکسی زین یا سایر اجزای موجود در فرمولاسیون.

- در صورت سابقه هرگونه واکنش حساسیتی غیر معمول به سایر آنتی هیستامین ها.

۲- در زمان مصرف این دارو از رانندگی و یا کار با ابزارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.<sup>(۲)</sup>

### موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به هیدروکسی زین یا سایر اجزای موجود در فرمولاسیون.<sup>(۱)</sup>

### مصرف در بارداری و شیردهی:

- هیدروکسی زین از جفت عبور کرده و در ماه های ابتدایی بارداری منع مصرف دارد.

- ترشح دارو در شیر مشخص نشده است و مصرف آن در شیردهی توصیه نمی شود.<sup>(۱)</sup>

### هشدارها و موارد احتیاط:

- مصرف این دارو در بیماری های تنفسی مثل آسم و COPD، گلوکوم، هایپرپلازی پروستات و انسداد مئانه باید با احتیاط صورت گیرد.

- در نارسایی کلیوی نیاز به تنظیم دوز می باشد به طوری که در  $GFR \leq 50 \text{ml/minute}$  دوز معمول باید ۵۰٪ کاهش یابد.

- در افراد مبتلا به سیروز صفراوی اولیه دوز مصرفی باید هر ۲۴ ساعت یک بار استفاده شود.

- در افراد مسن از مصرف هم زمان این دارو با داروهای آنتی کولینرژیک قوی به دلیل افزایش ریسک گیجی، خشکی دهان، بیوست و... اجتناب شود.<sup>(۱۲)</sup>

### تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر یا سایر داروها پزشک خود را مطلع سازید:

ایپراتروپیوم، تیوتروپیوم، ضد دردهای اپیویدی، آنتی کولینرژیک ها، آری پیرازول، باربیتورات ها، بوپرنورفین، سرکوب کننده های سیستم عصبی مرکزی، هیدروکودون، میریدین، پرامی پیکسول، ریمیپیرول، زولپیدم، SSRIs، بتاهستین، هیالورونیداز، مهارکننده های استیل کولین استراز، آمتانامین ها و...<sup>(۱)</sup>

### مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

### - آرامبخش قبل از جراحی:

برای کودکان ۶/۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز می باشد.

### - خارش و بی قراری:

کودکان کمتر از ۶ سال: ۵ میلی گرم روزانه در دوزهای منقسم.

کودکان ۶ سال و بالاتر: ۵ تا ۱۰ میلی گرم روزانه در دوزهای منقسم.<sup>(۱)</sup>

### عوارض جانبی:

هر دارو به موارث اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر یا غیر از آنچه در برگه راهنما ذکر شده است با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

گیجی، خواب آلودگی، خستگی، توم، عصبانیت، سردرد، خارش، کهیر، راش پوستی، خشکی دهان، لرزش، حرکات ناخودآگاه، پاراستزی، تاری دید، دپرسیون تنفسی و واکنش های آلرژیک.<sup>(۱)</sup>

### مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

### شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد)، دور از نور نگهداری و از بیخ زدگی محافظت نمایید.

### References:

1- Lexicomp Drug information handbook, 2015, 23<sup>rd</sup> edition, Pages: 1039-1041

2- USPDI, Advice for the Patient Drug information in Lay language, 2007, 27<sup>th</sup> edition, volume 1, Pages: 141-147



2205797/1

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:

تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰

ایمیل: exir\_cc@exir.co.ir

وب سایت: www.exir.co.ir