

لپراکس® cefixime

سفیکسیم

اگال دارویی و بسته بندی:
سفیکسیم شرکت داروسازی اکسیر به صورت قرص های روکش دار ۲۰۰ میلی گرمی و ۴۰۰ میلی گرمی در
بسته بندی ۱ عددی و هفچین پودر خشک جهت تهیه سوپسیسیون خوارکی (۱۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر)
به هر آن پیمانه و برگ راهنمایی به بازار عرضه می کردد.

دسته دارویی:
سفالوسپورین

راهنمایی های عمومی:
این دارو برای درمان بیماری فعلی همای تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیه آن به دیگران
چنان خودداری نمایید.
۱- قبل از مصرف این دارو یا سایر داروها یا حساسیت به غذاها و مواد محافظ و یا هر نوع ماده دیگر
در صورت حساسیت به این دارو یا غذاها و مواد محافظ در عقوباتی استریتوکوکوی.
۲- دوره درمان را کامل نکنید (خصوصاً در عقوباتی استریتوکوکوی).
۳- در صورتی که از سوپسیسیون خوارکی استفاده می شود قبل و بعد از مصرف، پیمانه را بشویید.
۴- در صورتی که از سوپسیسیون خوارکی استفاده می شود قبل و بعد از مصرف، پیمانه را بشویید.
۵- دارو بی تواند همراه غذا یا با فالسل از غذا می شود.
۶- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محنن به یاد آوردن آن را مصرف کنید اما اگر زمان نوبت
بعدی فرا رسیده باشد از مصرف دارو خودداری کرده و مقدار بعدی را در برابر نکنید. توجه کنید که هیچ نوبت از
مصرف دارو را فراموش نکنید و در فواصل مقتضی، مقدار لازم را میل کنید.
۷- دارو را بعد از تاریخ انقضای مصرف نکنید.^(۱)

موارد متع مصرف:
حساسیت به سفیکسیم یا هر ماده موجود در فرمولاسیون یا دیگر سفالوسپورین ها.
مصرف در کودکان و سالمدان:
- مصرف این دارو در کودکان در دوزهای موقت عوارض و اریثنشی مشابه با بزرگسالان دارد.
- مصرف این دارو در سالمدان نیز در دوزهای موقت عوارض و اریثنشی مشابه با بزرگسالان دارد.
مصرف در بارداری و شیردهی:
- مصرف این دارو را فراموش نکنید و در دوران بارداری در گروه B قرار دارد.
- درمورد ترشح این دارو در شیر اطاعات مخصوص موجود نمی باشد، لذا قبل مصرف با پزشک مشورت شود.^(۲)

هشدارها و موارد اختیاط:
۱- درمودوتی که در حد روز یکپارچه حاصل نشد با پزشک مشورت کنید.
۲- این دارو ممکن است پاسخ مثبت کلیب به تست گلکن ادرار با سواغات من ایجاد کند.
۳- در صورت بروز اسهال شدید قبل از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال، با پزشک خود مشورت کنید.
۴- در بیماران با تقصی عملکرد کلیوی تحریل دوز باید مورث کرید.
۵- در بیماران با سابقه حساسیت به پنی سیلین با احتیاط مصرف شود.

حدایالت دارویی:
- از مصرف همراه این دارو با واکسن ب ث برهه بزیر.
- این دارو ممکن است افراد را که امپیکایکوزید ها و آنتاگونیست های ویتمین K را افزایش دهد.
- سطح سفیکسیم ممکن است توسط داروی پروپنسید افزایش یابد.
- این دارو ممکن است سطح سدیم پیکوسولفات، واکسن های ب ث ۲ و تیفوئید را کاهش دهد.^(۳)

LOPRAX® cefixime

- مقدار و نحوه مصرف دارو:
- کودکان بزرگتر از ۱۲ سال و یا با وزن بیشتر از ۴۵ کیلوگرم، بالغین و بزرگسالان: ۲۰۰ میلی گرم هر ۲۴ ساعت و یا ۴۰۰ میلی گرم یک بار در روز میل شود. در درمان سوزاک مقدار اولپرائیس ۴۰۰ میلی گرم به صورت تک دور مصرف می شود.
 - کودکان بزرگتر از ۶ ماه و یا وزن کمتر از ۴۵ کیلوگرم: ۸ میلی گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن یکبار در روز یا تقسیم شده به دو بار در روز تا حد اکثر ۴۰۰ میلی گرم.
 - نوزادان: در نوزادان زیر شش ماه مقدار آن تعیین نشده است.
 - در اوتیت مدیا فرم سوپسیسیون با توجه به ایجاد غلظت خونی بالاتر در مقایسه با قرم، ارجح می باشد.^(۱)

عوارض جانبی:

درد شدید، نفخ سو هاضمه، حالت تروع، اسهال و مدفوع شل که معمول ترین مشکل مربوط به کودکان و یا بزرگسالان پس از تجویز دارو بوده است.
از جمله عوارضی که به ندرت بروز می کند واب نیازمند توجه ویژه درمان است عبارتند از: نارساین کلیه، آنکروادام، خارش، غفتت قارچی، افزایش کراتینین، گلیجن، تب دارویی، اریتم، ورم صورت، تب، هیاتیت، افزایش بیان روبین، عفوت واژن، ستدرم استیون جاسوسون، کویلت سودومیران، لکوبن، نوتروپنی، اوژنیوتوفیل و استفراغ.^(۲)

مساءویت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک با مرآکز درمانی مراجعه نمایید.

شرابیت نگهداری و توصیه های عمومی:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- سوپسیسیون آماده شده سفیکسیم به مدت ۷ روز در دمای اتاق و ۱۲ روز در دمای یخچال قابل نگهداری می باشد.
- سوپسیسیون آماده را از یخ زدگی محافظت نمایید.

References:

- 1-USPDI, Advice for the Patient Drug information in Lay language, 2007, 27th edition, volume 1, Pages: 361-366
- 2-Lexicomp Drug information handbook, 2015, 23rd edition, Pages: 373-374
- 3-USPDI, Advice for the Patient Drug information for the Health Care Professional, 2007, 27th edition, volume1 ,Pages: 762-771

