

LOSEXIR®
Losartan Potassium
Scored F.C. Tablet

لوزکسیپر®

لوزارتان پتاسیم
قرص روکش دار خط دار

مشخصات دارویی:

لوزارتان شرکت داروسازی اکسیر به صورت قرص های روکش دار خط دار ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی در جعبه های ۱۰۰ عددی به بازار عرضه می گردد.

دسته دارویی:

مسدود کننده رسپتور آنژیوتانسین

راهنامه های عمومی:

این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو درباره موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

۱- در صورت حساسیت و یا سابقه حساسیت به این دارو، سایر داروهای مسدود کننده گیرنده آنژیوتانسین و یا مواردی از قبیل غذاها، رنگ ها، مواد محافظ و ...

۲- در صورت مصرف داروهای مدر (دیورتیک)

۳- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی و یا کلیوی

۴- در صورت داشتن رژیم غذایی خاص از قبیل غذاهای کم نمک و غیره

- دارو را هر روز در زمان معینی مصرف کنید.

- میتوان این دارو را همراه یا بدون غذا مصرف کرد.

- درباره رژیم غذایی که می بایست در طول درمان رعایت نماید با پزشک خود مشورت کنید.

دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف ننمایید و از قطع مصرف خودسرانه دارو در صورت مشاهده بهبودی بدون مشورت با پزشک پرهیز کنید.

- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، پس از یادآوری بلافاصله آن را مصرف کنید. چنان چه نزدیک به نوبت بعدی بود از مصرف نوبت فراموش شده صرف نظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعد را دو برابر نکنید.

موارد مصرف دارو:

نفریاتی دیابتی، فشار خون بالا، فشار خون بالا همراه با هایپرتروفی بطن چپ

موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به لوزارتان یا اجزای سازنده قرص

- در بیماران مبتلا به دیابت که درحال مصرف آلیسکیرن می باشند.

مصرف در دوران بارداری:

داروهای موثر بر سیستم رنین آنژیوتانسین می توانند باعث مسمدات جبران ناپذیر و حتی مرگ نوزاد شوند از این رو در صورت تشخیص بارداری می بایست بلافاصله مصرف دارو قطع گردد و با پزشک معالج مشورت صورت گیرد.

مصرف در دوران شیردهی:

ترشح این دارو در شیر اثبات نشده است، بنابراین مصرف در خانم های شیرده توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

۱- طی درمان از مصرف هرگونه داروی دیگر (حتی داروهای که معمولاً نیاز به تجویز پزشک ندارند) بدون مشورت پزشک خودداری ننمایید. این داروها ممکن است متجر به کاهش اثر دارو و افزایش فشار خون بیمار شوند.

۲- هنگام شروع مصرف دارو ممکن است احساس گیجی و سبکی در سر وجود آید(به خصوص در مصرف همزمان با دیورتیک ها) لذا از رانندگی، کار با ماشین آلات و یا انجام فعالیت دیگری که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری ننمایید.

۳- بروز اسهال و یا استفراغ شدید یا مزمن ممکن است سبب کاهش فشار خون شود. در صورت بروز این موارد فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

۴- تعریق زیاد ممکن است سبب افت فشار خون، احساس گیجی و سبکی در سر و حتی از دست رفتن هوشیاری شود. در صورت انجام فعالیت های بدنی یا قرار گرفتن در هوای گرم احتیاط کنید.

۵- از مصرف الکل خودداری کنید.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان لوزارتان همراه داروهای زیر ممکن است موجب کاهش یا افزایش اثر لوزارتان و یا داروی جانبی شود. در صورت مصرف هر یک از این داروها با پزشک یا داروساز خود مشورت ننمایید:

مهارکننده های آنزیم میحل آنژیوتانسین، داروهای ضد چربی، سیپروفلوکساسین، سیکلوسپورین، کارودیول، دروسپیرتون، لوودوپا، لیتیم، تراهییدروکورتیکوئید، داروهای ضد قارچ خوراکی (مانند: فلوکانازول)، داپوکستین، نیکور اتدیل، پنتوکسین فیلین، متیل فنیدات، ریفامپین.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین میکند اما مقدار مصرف متداول آن به شرح ذیل می باشد:

درمان فشار خون

بزرگسالان: دوز معمول شروع، ۵۰ میلی گرم یک یا دو بار در روز که دوز مجموع روزانه می تواند بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم باشد.

دوز اولیه برای بیمارانی که داروهای مدر مصرف می کنند و یا کسانی که دچار کاهش حجم داخل عروقی هستند، روزانه ۲۵ میلی گرم است.

کودکان بین ۶ تا ۱۶ سال: ۰/۷ میلی گرم دارو بر کیلوگرم یک مرتبه در روز، ماکزیمم دوز ۱۰۰ میلی گرم روزانه.

نفریاتی دیابتی

۵۰ میلی گرم یک مرتبه در روز و سپس بسته به پاسخ بیمار با نظر پزشک، تا ۱۰۰ میلی گرم در روز می توان دوز را افزایش داد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات آثار درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت ننمایید.

عوارض شایع دارو عبارت اند از: سرفه (شایع تر بین بیمارانی که سابقه این عارضه را با داروهای مانند کاپتوپریل، اتالپریل و ... داشته اند)، از عوارض کمتر شایع دارو میتوان به درد قفسه سینه، افت فشارخون و افت فشار خون وضعیتی، گیجی، خستگی، عفونت مجاری ادراری، عفونت بخش فوقانی مجاری تنفسی، هایپرکالمی، هایپوگلیسمی

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه در برکه راهنما قید گردیده است، با پزشک خود، داروساز و یا مراکز درمانی بگیریید.

مهمیویت:

در صورت مصرف بیش از مقداری تجویز شده فوراً با پزشک تماس بگیریید.

شرایط نگهداری دارو و توصیه های عمومی:

۱- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۲- دارو را دور از نور، حرارت، نور مستقیم و رطوبت نگهداری کنید.

۳- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

۴- از قرار دادن دارو در یخچال و فریزر خودداری کنید.

References:

- 1) USPLDI 2007, volume II, pages: 1862-1865
- 2) Lexicomp 2017, 25th edition, pages: 1248-1250



2205546/1 R1

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:
تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰
ایمیل: exir_cc@exir.co.ir
وب سایت: www.exir.co.ir

EXIR 98.04.15
W*L: 100 * 140
286 U
2415 U