

## متفورمین - اکسیر متفورمین

## METFORMIN-EXIR Metformin

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

### راهنماییهای عمومی:

- در صورت وجود سابقه حساسیت به این دارو یا سایر داروهای مشابه و یا وجود بیماریهایی نظیر تهوع، اسهال، تب و ناراحتی های گوارشی حتماً پزشک خود را در جریان بگذارید.
- در صورت مصرف همزمان داروهای دیگر حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.
- دارو را طبق دستور پزشک مصرف ننمایید.
- در صورتیکه مصرف یک دوز دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری آن را مصرف کنید. در صورتیکه زمان مصرف دوز بعدی رسیده باشد از مصرف دوز فراموش شده صرف نظر کنید.

### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی غیر مجاز می باشد مگر در موارد اضطراری و به تشخیص پزشک متخصص.

### هشدارها:

- در صورت داشتن سابقه بیماری کبدی، کلیوی، تیروئید، نارسایی قلبی، سکته قلبی، شوک یا نارسایی ریوی، اعتیاد به الکل و سیانوز حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.
- این دارو از طریق کلیه دفع می شود و باید در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و بیماران سالخورده با احتیاط تجویز شود. توصیه می شود عملکرد کلیه ها بطور منظم بررسی شود.
- مصرف این دارو باید ۳-۲ روز قبل از اعمال جراحی یا انجام آزمونهای بالینی، مانند پرتونگاری از کلیه و آنژیوگرافی، قطع شود و مصرف مجدد آن بعد از کنترل عملکرد کلیه شروع گردد.
- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد دیابت و انسولین ممکن است باعث کاهش قند خون شود. برای بدست آوردن نسبت مناسب مصرف توأم این داروها اندازه گیری قند خون در شروع درمان توصیه می شود.
- در صورت مصرف این دارو با داروهای ضد انعقاد خوراک، مقدار مصرف داروهای ضد انعقاد باید تنظیم شود.
- مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود مگر با تجویز پزشک متخصص.

- مصرف این دارو ممکن است موجب کاهش جذب ویتامین B<sub>12</sub> و اسید فولیک شود، لذا کنترل آنها در طول درمان الزامی است.
- برای بررسی پیشرفت درمان مرتباً به پزشک مراجعه کنید.

### مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است:  
ابتدا مقدار ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز صبح و عصر همراه با غذا مصرف می شود. در صورت عدم کنترل علائم بیماری مقدار مصرف را می توان هفته ای ۵۰۰ میلی گرم افزایش داد.  
برای درمان نگهدارنده مقدار ۸۵۰-۵۰۰ میلی گرم ۳-۲ بار در روز همراه با غذا مصرف می شود.  
حداکثر مقدار مصرف این دارو در بزرگسالان ۲۵۵۰ میلی گرم در روز است.

### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:  
اختلالات گوارشی (این عوارض معمولاً خودبخود برطرف می شوند)، اسهال، اسیدوز ناشی از اسید لاکتیک، آتمی مگالوبلاستیک، افزایش حساسیت و پانکراتیت، بی اشتها، اختلال گوارشی، نفخ، سردرد، احساس طعم فلزی در دهان، تهوع، استفراغ و از دست دادن وزن.  
**مسمومیت:**  
در صورت مصرف اتفاقی مقادیر بیش از حد دارو بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.

### شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

### اشکال دارویی:

قرص ۵۰۰ میلی گرمی



راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:  
تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰  
ایمیل: exir\_cc@exir.co.ir  
وبسایت: www.exir.co.ir



2205180/4