

# SANOXIR®

# سانوکسییر®

### مشخصات دارو:

شریت سانوکسییر® دارای ۹ ویتامین ضروری برای رشد همراه با زینک به صورت جعبه های تک عددی حاوی ۲۰۰ گرم شریت به همراه برکه راهنما به بازار عرضه می گردد.

ترکیبات	۵ میلی لیتر شامل	RDA کودکان ۱-۸ سال	RDA کودکان ۹-۱۸ سال	RDA بزرگسالان بالای ۱۸ سال
ویتامین A	۱۲۰۰ IU	۹۹۹ IU	۱۹۹۸ IU	۱۹۹۸ IU
ویتامین D <sub>3</sub>	۲۰۰ IU	۶۰۰ IU	۶۰۰ IU	۶۰۰ IU
ویتامین E	۱/۵ IU / 1 mg	۱۴ IU	۲۵ IU	۳۴ IU
ویتامین C	۵۰/۰ mg	۱۵/۰ mg	۴۵/۰ mg	۹۰/۰ mg
ویتامین B <sub>1</sub>	۱/۰ mg	۰/۵ mg	۰/۹ mg	۰/۹ mg
ویتامین B <sub>2</sub>	۱/۰ mg	۰/۵ mg	۰/۹ mg	۰/۹ mg
ویتامین B <sub>6</sub>	۰/۵ mg	۰/۵ mg	۱/۰ mg	۱/۳ mg
نیوکوتینامید	۵/۰ mg	۶/۰ mg	۱۲/۰ mg	۱۲/۰ mg
دکسیپانتنول	۲/۰ mg	۲/۰ mg	۴/۰ mg	۵/۰ mg
کلسیم گلوکونات	۲۵/۰ mg	-	-	-
کلسیم فسفولکات	۲۵/۰ mg	-	-	-
زینک	۲/۵۱ mg	-	-	-

### دسته دارویی:

مکمل، مولتی ویتامین همراه با زینک

### موارد مصرف:

جلوگیری از کمبود ویتامین در تمام گروه های سنی و در دوران بارداری و شیردهی، بی اشتهاهی، آمادگی ابتلا به عفونتها و مشکلات رشد و نمو کودکان، در شرایط خستگی مفرط، کاهش تمرکز و خستگی از مدرسه، جهت تسریع بهبودی در دوره نقاهت

### موارد منع مصرف:

- حساسیت به هریک از اجزای موجود در فرمولاسیون  
- ابتلا به بیماری هایی نظیر هایپروویتامینوز، هایپرکلسمی، هایپرکلسمی اوری

### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- تعیین دوز و نحوه مصرف فرآورده در خانم های باردار باید بر اساس نظر پزشک و وضعیت بالینی بیمار صورت گیرد.  
- تعیین دوز و نحوه مصرف فرآورده در خانم های شیرده باید بر اساس نظر پزشک و وضعیت بالینی بیمار صورت گیرد.

### هشدارها و موارد احتیاط:

- این محصول مکمل غذایی بوده و برای تشخیص، پیشگیری و یا درمان نمی باشد.  
- در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.  
- این فرآورده ممکن است باعث تغییر رنگ احتمالی ادرار به زرد شود که به دلیل ویتامین B<sub>۲</sub> موجود در شریت می باشد و کاملاً بی خطر است.  
- این فرآورده نباید به مدت طولانی بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود مگر این که توسط پزشک توصیه گردد.  
- قابل توجه افراد دیابتی:  
- ۱۰ میلی گرم از فرآورده سانوکسییر® (۲ قاشق مرباخوری) حاوی حدود ۸ گرم کربوهیدرات است.

### تداخلات دارویی:

- سطح ویتامین D در مصرف همزمان با داروهایی مانند کاربامازپین، فنی تونین، پرمیدون و باربیتورات ها ممکن است افزایش یابد.

- ریسک هایپر ویتامینوز A در مصرف همزمان با رتینوئیدها وجود دارد.

### مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف، توسط پزشک مشخص می شود اما مقدار مصرف معمول آن به شرح زیر می باشد:  
- در کودکان ۵-۱۰ سال، روزانه ۱ قاشق مرباخوری (۵ میلی لیتر) و در کودکان بزرگ تر از ۵ سال و افراد بالغ روزانه ۳-۲ قاشق مرباخوری (۱۵-۱۰ میلی لیتر) مصرف شود.

### عوارض جانبی:

شریت سانوکسییر® نباید به مدت طولانی بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود مگر اینکه توسط پزشک توصیه گردد.  
مصرف این فرآورده بیش از مقدار ذکر شده بویژه همزمان با مصرف سایر فرآورده های حاوی ویتامین D، می تواند منجر به افزایش میزان ویتامین D در بدن شود.

### شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

- قبل از مصرف، شیشه را تکان دهید.  
- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری کنید.  
- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ مصرف گذشته جدا خودداری کنید.  
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی اکسیر - ایران

### References:

1-Lexicomp Drug information handbook, 2015, 23<sup>rd</sup> edition , Pages: 2222, 2223, 2251  
2- BNF 73, September 2017,pages: 948,949 & Appendix 1: interactions, page: 1346



2205172/IR1

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:  
تلفن گویا: ۰۲۱ - ۸۸۹۱۰۹۱۰  
ایمیل: exir\_cc@exir.co.ir  
وب سایت: www.exir.co.ir

EXIR 28.03.96  
W x L = 120 x 175 mm  
Text : 286 U  
Headline : Orange 021 U