

# سد-آف® فکسوفنادین

**اشکال دارو:**  
قرص سد-آف® تولیدی شرکت داروسازی اکسیر، به صورت قرص های روکش دار در دو دوز ۱۲۰ و ۱۸۰ میلی گرم حاوی فکسوفنادین هیدروکلراید به عنوان ماده موثره می باشد، که در بسته بندی های ۱۰۰ عددی به همراه برگه راهنما به بازار عرضه می گردد.

**دسته دارویی:** (۱)

**آنتی هیستامین نسل دوم**

**راهمایی های عمومی:** (۲)

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

دارو را فقط همراه یک لیوان آب مصرف نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

در صورت بارداری و شیردهی و همچنین در صورت ابتلا به نارسیایی کلیوی

**موارد منع مصرف:** (۳)

- حساسیت به فکسوفنادین و یا سایر اجزاء فرمولاسیون.

**مصرف در دوران بارداری و شیردهی:** (۴)

مطالعات کافی در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری صورت نگرفته است، در صورت لزوم استفاده از آنتی هیستامین ، آنتی هیستامین های نسل دوم ارجح می باشد و با توجه به نظر پزشک مجاز می باشد.

با توجه به تریخ دارو در شیر و احتمال بروز عوارض جانبی در شیرخوار مصرف آن باید با احتیاط و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

**همدارها و موارد احتیاط:** (۵)

مصرف این دارو در بیماران با نارسیایی کلیوی باید با احتیاط و با نظر پزشک صورت بگیرد، و در صورت لزوم استفاده نیاز به تنظیم دوز دارد.

از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید.

از مصرف هم زمان با داروهای آنتی اسید نظیر: آلومینیوم و منیزیم و همچنین آنتی بیوتیک خودداری نمایید.

**تداخلات دارویی:** (۶)

از مصرف هم زمان فکسوفنادین با داروهایی ذیل خودداری نمایید: آکلیدینوم، آزالاستین (نازال)، گلوکوکون، اپراتروپیوم، نیتروکلپرسین، اورفنادین، پاتاسیم کلرید، تالیدوماید، تیوتروپیوم.

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک و یا داروساز خود را مطلع سازید.

**مقدار و نحوه مصرف دارو:** (۷)

مقدار و نحوه مصرف هر دارو باید توسط پزشک مشخص گردد. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد: (۸)

- بزرگسالان و کهنسالان:

درمان کپیر زمین (ایدیوپاتیک): ۶۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت.

درمان آلرژی سیستم تنفسی فوقانی: ۶۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت و یا ۱۸۰ میلی گرم به صورت تک دوز.

- کودکان:

کودکان ۶ الی ۱۱ سال: درمان آلرژی سیستم تنفسی فوقانی: ۳۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت.

کودکان بزرگتر از ۱۲ سال: به دوز بزرگسالان مراجعه شود.

تنظیم دوز در بیماران کلیوی:

- بزرگسالان:

کراتینین کلیرانس بیشتر از ۵۰ میلی لیتر در دقیقه: نیاز به تنظیم دوز نمی باشد.

کراتینین کلیرانس بین ۵۰ - ۱۰۰ میلی لیتر در دقیقه: تجویز دوز مورد نیاز هر ۱۲ الی ۲۴ ساعت.

کراتینین کلیرانس کمتر از ۱۰ میلی لیتر در دقیقه: تجویز دوز مورد نیاز هر ۲۴ ساعت.

بیماران پیوند کلیه: ۶۰ میلی گرم هر ۲۴ ساعت.

- نوزادان، کودکان و نوجوانان:

کراتینین کلیرانس بیشتر از ۵۰ میلی لیتر در دقیقه در ۱/۲۳ مترمربع: نیاز به تنظیم دوز نمی باشد.

کراتینین کلیرانس بین ۵۰ - ۱۰۰ میلی لیتر در دقیقه در ۱/۲۳ مترمربع: ۶۰ میلی گرم هر ۲۴ ساعت.

کراتینین کلیرانس کمتر از ۱۰ میلی لیتر در دقیقه در ۱/۲۳ مترمربع و بیماران دیالیزی: ۳۰ میلی گرم هر ۲۴ ساعت.

در بیماران کبدی نیاز به تنظیم دوز نمی باشد.

**مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:** (۹)

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه ی این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

سیستم عصبی: سرگیجه، خواب آلودگی، خستگی، سردرد، درد.

سیستم گوارشی: اسهال، سوء هاضمه، تهوع و استفراغ.

سیستم عضلانی - اسکلتی: درد کمر و اعضا ی بدن، درد عضلانی.

گوش: التهاب گوش میانی.

سیستم ادراری و تنفسی: دیسمنوره.

سیستم تنفسی: سرفه، آبریزش بینی، عفونت سیستم تنفسی فوقانی.

سایر: تب، عفونت ویروسی، واکنشهای حساسیتی (نادر)

**مسمومیت:**

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سربماً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

**شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:** (۱۰)

در دمای اتاق، کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و گرما نگهداری و از رطوبت محافظت شود.

از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته جداً خودداری کنید و هنگام خارج کردن دارو از بسته بندی اصلی، دارو را بلافاصله مصرف نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

## References:

1. Lexicomp Drug Information Handbook, 2018, 26<sup>th</sup> edition, Pages: 974-975
2. BNF, Volume 74, Pages: 269, 674



راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:  
تلفن گویا: ۰۲۱-۸۸۹۱۰۹۱۰  
ایمیل: [edrx\\_cc@edrx.co.ir](mailto:edrx_cc@edrx.co.ir)  
وب سایت: [www.edrx.co.ir](http://www.edrx.co.ir)

