



## تایلوفن® استامینوفن (سوسپانسیون)

**TYLOPHEN®** Acetaminophen (Suspension)



2205331/1R2

این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید .

### راهنماییهای عمومی :

- ۱ . قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج در موارد زیر مشورت نمایید :  
- در صورت وجود سابقه هر نوع حساسیت نسبت به استامینوفن یا هر داروی دیگر . نیز در صورت حساسیت به هر نوع غذا ، رنگهای خوراکی ، مواد محافظ و غیره .  
- در صورت وجود هر نوع عارضه ای نظیر اعتیاد به الکل ، بیماری شدید کلیوی ، هیپاتیت یا دیگر بیماریهای کبدی .  
در صورت مصرف سایر داروها بویژه آستوکومارول ، کاربامازپین ، ایزونیازید ، فنی تونین ، وارفارین ، زیدو-وویدین ، سایر فرآورده های حاوی استامینوفن .
- ۲ . پیش از هر بار مصرف ، بطری را کاملاً تکان دهید و پس از استفاده در ظرف را محکم ببندید .
- ۳ - دارو را طبق نظر پزشک مصرف نموده و از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده خودداری نمایید .
- ۴ . قبل و بعد از هر بار مصرف پیمانه را بشویید .
- ۵ . در صورت نیاز به انجام تست های آزمایشگاهی ، اگر در طی ۳ یا ۴ روز قبل از انجام آزمایش استامینوفن مصرف کرده اید پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید .
- ۶ . مصرف استامینوفن ممکن است باعث نتایج غلط در اندازه گیری قند خون شود در این مورد از پزشک خود راهنمایی بگیرید .

### مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری / شیردهی باید زمانی صورت گیرد که فواید آن بر آثار سوء، احتمالی بر جنین / نوزاد برتری داشته باشد .

### هشدارها :

- ۱ . از مصرف همزمان سایر فرآورده های حاوی استامینوفن خودداری کنید .
- ۲ . مصرف همزمان الکل با این دارو ، احتمال آسیب کبدی را افزایش میدهد .
- ۳ . از مصرف بیشتر از پنج بار در روز برای کودکان ۱۲ ساله و کوچکتر خودداری نمایید ، مگر آنکه پزشک دستور داده باشد .

۴ . در صورت وقوع هر یک از موارد زیر با پزشک مشورت نمایید :

- در موارد مصرف به عنوان ضد درد : ادامه درد بیش از ۱۰ روز در افراد بزرگسال و یا بیش از ۵ روز در کودکان ، شدیدتر شدن آن ، بروز علائم جدید ، سرخی یا تورم در ناحیه دردناک .
- در موارد مصرف به عنوان تب بر : ادامه تب بیش از ۳ روز یا عود تب ، شدیدتر شدن تب ، بروز علائم جدید ، یا در صورت وجود سرخی یا تورم .
- به عنوان تسکین گلودرد : شدت یافتن گلودرد ، ادامه گلو درد بیش از ۲ روز یا همراه بودن آن با تب، سردرد ، بثورات پوستی ، تهوع و استفراغ .

### توجه :

- در موارد فوق الذکر (درمان تب و درد ، از جمله گلودرد) از خود درمانی بویژه در کودکان اکیداً خودداری کنید .
- ۵ . از مصرف همزمان آسپیرین و دیگر سالیسیلات ها و یا سایر دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی با استامینوفن برای مدت بیش از دو یا سه روز بدون تجویز پزشک خودداری نمایید .

MA155  
70M0417300  
170\*210 mm



2205331/1R2

### مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف مناسب را با توجه به دستور پزشک و بر اساس وزن یا سن کودک از جدول زیر بدست آورید . در صورت نیاز می توان این مقدار را هر ۴ تا ۶ ساعت و حداکثر تا ۵ بار در روز تکرار کرد .

جدول مقدار مصرف بر اساس سن و وزن

سن (سال)	متوسط وزن (کیلوگرم)	مقدار مصرف (میلی گرم)	مقدار مصرف (میلی لیتر)
۳	۱۴/۳ - ۱۱/۷	۱۶۰	۶/۵
۴ - ۵	۱۸/۳ - ۱۴/۵	۲۴۰	۱۰
۶ - ۸	۲۵/۵ - ۱۸/۵	۳۲۰	۱۳/۵
۹ - ۱۰	۳۱/۵ - ۲۶	۴۰۰	۱۶/۵
۱۱	۳۷ - ۳۲	۴۸۰	۲۰
۱۲ - ۱۴	۵۱ - ۳۷/۵	۶۴۰	۲۶/۵
> ۱۴	-	۶۵۰	۲۷

\* در کودکان زیر ۳ سال با نظر پزشک مصرف شود .

توجه :

\* درمان با مقادیر بیشتر بایستی توسط پزشک بررسی و تجویز گردد .

### عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود که بعضی از این عوارض در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارد .

در صورت بروز هر یک از عوارض زیر فوراً به پزشک خود اطلاع دهید :

زردی چشم ها یا پوست ، علائم مسمومیت (شامل اسهال ، تعریق زیاد ، بی اشتهایی ، تهوع یا استفراغ ، درد یا کرامپ معده ، تورم ، درد یا حساسیت به لمس در قسمت فوقانی شکم یا ناحیه معده ) .

همچنین در صورت بروز هر یک از عوارض زیر که ندرتاً ممکن است اتفاق افتد در اسرع وقت به پزشک خود اطلاع دهید :

مدفوع قیری شکل سیاه یا خونی ، وجود خون در ادرار یا کدورت ادرار ، تب یا گلو درد (که بعد از آغاز درمان شروع شود و ناشی از بیماری که استامینوفن برای درمان آن بکار رفته است نباشد) ، درد شدید در کمر و پهلوها ، بروز نقاط ریز سرخ در پوست ، خارش ، کهیر و بثورات پوستی ، زخم یا لکه های سفید رنگ در دهان یا لبها ، کاهش ناگهانی مقدار ادرار ، کبودی یا خونریزی غیر عادی ، خستگی یا ضعف غیر معمول .

همچنین در صورت بروز هر عارضه احتمالی دیگر به پزشک خود اطلاع دهید .

### مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدارهای تعیین شده بلافاصله به پزشک مراجعه گردد.

علائم مسمومیت ممکن است ۲ تا ۴ روز بعد بروز نماید اما درمان برای جلوگیری از تخریب کبد و مرگ بایستی به سرعت آغاز شود . در صورتیکه درمان بعد از ۲۴ ساعت آغاز شود ، ممکن است در جلوگیری از عوارض مسمومیت بی تأثیر باشد .

### شرایط نگهداری و توصیه های عمومی :

- ۱ . دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .
- ۲ . از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .
- ۳ . دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- ۴ . پس از هر بار مصرف در بطری را کاملاً ببندید .

### اشکال دارویی :

سوسپانسیون حاوی ۱۲۰ میلی گرم استامینوفن در هر ۵ میلی لیتر .



2205331/1R2

MA155  
70M0417300  
170\*210 mm