

این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

**راهنماییهای عمومی :**

در صورت مصرف داروهای دیگر نظیر آسپیرین، ریفامپین، فنی تونین، فنوباربیتال و کاربامازپین، با پزشک معالج خود مشورت کنید.

مقدار دارو را طبق نظر پزشک و در فواصل زمانی تعیین شده مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنید. هرگز به خودسرانه قطع نکنید. از قطع ناگهانی مصرف دارو بعد از استفاده طولانی (بیش از سه هفته) پرهیز شود. جگر، کلیه و استخوانها را در طول درمان معاینات چشم پزشکی در طول درمان درازمدت، بطور مرتب باید انجام شود. در درمان درازمدت، مصرف سدیم باید محدود شده و مصرف مکمل های حاوی پتاسیم توصیه می شود. نوزادان و کودکانی که مصرف طولانی مدت دارند، باید از نظر رشد پیگیری شوند.

**مصرف در دوران بارداری و شیردهی:**

مصرف این دارو باید زیر نظر پزشک متخصص و زمانی صورت گیرد که فواید آن بر آثار سوء، احتمالی بر جنین برتری داشته باشد و نوزادانی که از مادران مصرف کننده این دارو متولد می شوند باید از نظر کم کاری غده فوق کلیه بررسی شوند.

**هشدارها :**

این دارو نباید داخل وریدی تزریق شود. افرادی که این دارو را مداوم و با دوز بالا مصرف می کنند، باید از تماس با افراد مبتلا به آبله مرغان یا سرخک پرهیز کنند و در صورت تماس، اقدامات پزشکی باید بدون تاخیر انجام شود.

این دارو در بیماران مبتلا به هرپس سیمپلکس چشمی باید با احتیاط مصرف شود. در صورت ابتلا به عفونتهای قارچی سیستمیک به هیچ عنوان نباید این دارو را مصرف نمود.

در طول مدت مصرف دارو، واکسیناسیون نباید انجام شود. افرادی که سل فعال یا نهفته دارند، در صورت مصرف این دارو، باید از داروهای ضدسل مناسب استفاده کنند.

این دارو با بی حس کننده های موضعی تزریقی که حاوی پارابنها، فنلها و سایر محافظها هستند، نباید مخلوط شود. در صورتی که نیاز به تزریق همزمان باشد، ابتدا سوسپانسیون و سپس بی حس کننده موضعی را وارد سرنگ کرده و فوراً تزریق نمایید.

مصرف این دارو در افراد مسن و به خصوص خانمهای یائسه امکان ایجاد پوکی استخوان و افزایش فشارخون را بالا می برد. **مقدار و نحوه مصرف دارو:**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است: در آرتریت روماتوئید، آستوآرتریت و بعد از تروما مقدار ۱۲-۱/۵ میلیگرم (بسته به سایز مفصل درگیر) بصورت داخل مفصلی تجویز می شود که در صورت نیاز قابل تکرار است.

در اختلالات پوستی مقدار ۱/۲ میلیگرم به ازای هر سانتیمتر مربع پوست آسیب دیده بصورت داخل جلدی هر ۷-۳ روز تجویز می شود.

در آسم، برونشیت ریئیت آلرژیک یا فصلی مقدار ۶-۱۲ میلیگرم هفته ای یکبار عضلانی تجویز می شود. در نقرس و التهابهای کیسه مفصلی مقدار ۶-۱/۵ میلیگرم بصورت داخل عضلانی یا داخل مفصلی تجویز شده که در صورت نیاز هر ۷-۳ روز تکرار می شود.

توجه: در کودکان تزریق فرم سوسپانسیون بتامتازون توصیه نمی شود.

عوارض جانبی که نیاز به توجهات پزشکی دارند، عبارتند از :

احتباس سدیم و مایعات و افزایش فشارخون، CHF در بیماران حساس، فقدان پتاسیم و آلکالوز هیپوکالمی

عوارض چشمی مثل آب مروارید، گلوکوم و اگزوفتالمی

کاهش رشد در کودکان

دیابت

استئوپروز، میوپاتی و شکستگی استخوانهای بلند

واکنشهای آنافیلاکتیک و شوک

عوارض جانبی که در صورت ادامه بروز و یا مزاحمت برای بیمار نیاز به توجهات پزشکی دارند، عبارتند از :

عوارض گوارشی مثل زخم معده، اتساع شکم، التهاب پانکراس، التهاب زخم شونده مری، سسکسه

عوارض پوستی مانند پوست نازک و شکننده، پتشی، قرمزی صورت، ورم، هیپر یا هیپوپپیگمانتاسیون پوست، آتروفی جلد و زیرجلد (مربوط به نحوه تزریق است)

عوارض عصبی مثل تشنج و سرگیجه، سردرد و افزایش فشار داخل نخاع

بی نظمی در قاعدگی و افزایش BUN (دفع نیترژن در ادرار)

**مسمومیت:**

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

**شرایط نگهداری و توصیه های عمومی :**

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

قبل از مصرف تکان داده شود.

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت گردد.

**اشکال دارویی :**

آمپول یک میلی لیتری حاوی ۳mg بتامتازون ( بصورت دی سدیم فسفات ) و ۳mg بتامتازون استات در بسته های ۱۰ عددی

آمپول یک میلی لیتری حاوی ۳mg بتامتازون ( بصورت دی سدیم فسفات ) و ۳mg بتامتازون استات در بسته های ۱۰ عددی

آمپول یک میلی لیتری حاوی ۳mg بتامتازون ( بصورت دی سدیم فسفات ) و ۳mg بتامتازون استات در بسته های ۱۰ عددی

آمپول یک میلی لیتری حاوی ۳mg بتامتازون ( بصورت دی سدیم فسفات ) و ۳mg بتامتازون استات در بسته های ۱۰ عددی

آمپول یک میلی لیتری حاوی ۳mg بتامتازون ( بصورت دی سدیم فسفات ) و ۳mg بتامتازون استات در بسته های ۱۰ عددی

آمپول یک میلی لیتری حاوی ۳mg بتامتازون ( بصورت دی سدیم فسفات ) و ۳mg بتامتازون استات در بسته های ۱۰ عددی

آمپول یک میلی لیتری حاوی ۳mg بتامتازون ( بصورت دی سدیم فسفات ) و ۳mg بتامتازون استات در بسته های ۱۰ عددی

آمپول یک میلی لیتری حاوی ۳mg بتامتازون ( بصورت دی سدیم فسفات ) و ۳mg بتامتازون استات در بسته های ۱۰ عددی

