

این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمائید.

راهنمایی های عمومی:

۱. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت کنید:
در صورت وجود سابقه حساسیت به هر یک از سفالوسپورینها، پنی سیلین ها یا هر نوع دارو، غذا و یا مواد دیگر.
در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر.
در صورت ابتلا به بیماریهای کلیوی؛ در صورت وجود یا سابقه بیماریهای معده و روده بویژه کولیت (از جمله کولیت متعاقب مصرف دارو) یا التهاب روده کوچک؛ در صورت سابقه خونریزی (مشکلات انعقادی)
۲. دارو را در فواصل زمانی معین طبق دستور پزشک مصرف کنید.
۳. دوره درمان را کامل کنید. مصرف نادرست و ناقص این دارو ممکن است سبب باقی ماندن عفونت در بدن و در بعضی موارد باعث بروز عوارض قلبی و کلیوی شود.
۴. این دارو را می توان قبل و یا بعد از غذا میل کرد. در صورت تیکه مصرف آن سبب ناراحتی معده شود بهتر است آن را همراه غذا میل کرد.
۵. برای مصرف دقیق سوسپانسیون باید از پیمانه مدرج استفاده کرد. از فاشقهای معمولی موجود در خانه به دلیل عدم تعیین دقیق مقدار تجویز شده نمی توان استفاده کرد.
۶. اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوری آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده است از نوبت فراموش شده صرف نظر کرده نوبت بعد را هم دوبار نکنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف دارو در صورت باردار بودن و یا شیردهی به پزشک اطلاع دهید.

هشدارها:

۱. این دارو ممکن است موجب نتایج غلط در اندازه گیری قند ادرار شود.
۲. اگر طی چند روز از شروع درمان علائم بیماری کاهش نیافت به پزشک خود اطلاع دهید.
۳. بدون مشورت با پزشک از مصرف داروهای ضد اسهال خودداری کنید. در صورت بروز اسهال شدید فوراً به پزشک اطلاع دهید. همچنین در صورت تداوم اسهال خفیف با پزشک مشورت کنید.
۴. از مصرف الکل طی درمان با سفالکسین خودداری کنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند که باید دقیقاً از آن پیروی کرد. مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است:

- بزرگسالان:** ۲۵۰ میلیگرم تا ۱ گرم هر ۶ تا ۱۲ ساعت.
- کودکان با وزن ۴۰ کیلوگرم یا بیشتر:** ۲۵۰ میلیگرم تا ۱ گرم هر ۶ تا ۱۲ ساعت.
- کودکان یک ساله یا بزرگتر (با وزن کمتر از ۴۰ کیلوگرم):** ۶/۲۵ تا ۲۵ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۶ ساعت یا ۱۲/۵ تا ۵۰ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت.
- نوزادان و کودکان یک ماهه تا یک ساله:** ۶/۲۵ تا ۱۲/۵ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۶ ساعت.

عوارض جانبی:

هر دارو بموازات اثرات درمانی دارای عوارض ناخواسته ای است که لزوماً همه آنها در یک بیمار دیده نمی شود. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر که ندرتاً ممکن است رخ دهند فوراً با پزشک خود تماس بگیرید:

درد شدید معده یا شکم، حساسیت شکم به لمس، اسهال شدید آبکی احیاناً خونی، تب، خونریزی یا کبودی غیر معمول (توجه: بعضی از این عوارض ممکن است تا چند هفته پس از پایان مصرف دارو رخ دهند)، تاول، جدا شدن لایه ای از پوست یا شل شدن پوست، تشنج، کاهش میزبان ادرار، کری، درد مفاصل، بی اشتها، تهوع، استفراغ، بثورات جلدی، خارش، سرخی و تورم، اشکال در تنفس، خستگی و ضعف غیر معمول، زردی چشم و پوست.

گروهی دیگر از عوارض معمولاً خودبخود مرتفع می شوند بهر حال در صورت تداوم و یا مزاحمت این عوارض به پزشک خود اطلاع دهید:

اسهال ملایم (بدون مشورت با پزشک از مصرف داروهای ضد اسهال خودداری کنید)، سر درد، زخم دهان یا زبان، کرامپ معدی ملایم، خارش یا ترشح مهبل.

نیز هرگونه عارضه احتمالی دیگر را به پزشک اطلاع دهید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیشتر از مقدار تجویز شده فوراً با پزشک خود مشورت کنید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

۱. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
۲. از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
۳. در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداری کنید.
۴. سوسپانسیون را بعد از آماده سازی در یخچال نگهداری کرده از یخ زدن محافظت کنید.

اشکال دارویی:

سفالکسین شرکت اکسیر بصورت کپسولهای ۲۵۰ و ۵۰۰ میلیگرمی و سوسپانسیون ۲۵۰ mg/۵ ml عرضه شده است.

