

قبل از مصرف این دارو، عدم وجود حساسیت بیمار (کهیر، تنگی نفس، تورم صورت، لب ها، زبان و گلو) به سفالوسپوئین ها بررسی و از آن اطمینان حاصل شود.

این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیه آن به دیگران خودداری نمایند.

راهنماییهای عمومی :

- قبل از مصرف این دارو در موادر زیر با پزشک معالج خود مشورت کنید:
- در صورت وجود حساسیت به هر نوع دارو، غذّا و یا مواد دیگر.
- در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر.
- در صورت ابتلای به بیماریهای کلیوی، در صورت وجود یا سابقه بیماریهای معده و روده بویژه کولیت (از جمله کولیت متعاقب مصرف دارو) یا التهاب روده و یا هر نوع بیماری دیگر.
- دارو را در فواصل زمانی معین طبق دستور پزشک مصرف کنید.
- دوره درمان را کامل کنید.

- اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوری آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده است از نوبت فراموش شده مرغتظر نوبت بعد را هم دوباره نکنید.

- پس از اضطراریه کردن حال و حل شدن کامل پودر، در صورت مشاهده ذرات معلق از تزریق خودداری کنید.

- رنگ پودر سفید تا زرد کمرنگ است، پس از حل شدن باقیه به نوع حال، رقت آن و شرایط نگهداری، زرد روشن تا کهربایی است.

صرف در دوران بارداری و شیردهی :

قبل از مصرف این فرآورده در صورت بارداری یا شیردهی پزشک را مطلع سازید.

هشدارها :

1. این دارو ممکن است موجب نتابی غلط در اندازه کیری قند ادرار شود.
2. اگر طی چند روز از شروع درمان علائم بیماری کاهش نیافتد به پزشک خود اطلاع دهید.
3. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک از مصرف داروهای ضد اسهال خودداری کنید. (در صورت اسهال شدید فوراً به پزشک اطلاع دهید).
4. از تزریق این دارو در غیر از مراکز درمانی خودداری شود.
5. مصرف هم‌مان سفتریاکسون با محلولها یا فرآورده های حاوی کلسیم در نوزادان و سایر گروه های سنی حتی به صورت اتفاقی ممکن است از میزان مصرف معمولی خودبخود مترعف می شود.
6. مصرف محلولها یا فرآورده های حاوی کلسیم ۴۸ ساعت پس از آخرین دوز سفتریاکسون در تمام گروه های سنی ممنوع می باشد.
7. مصرف سفتریاکسون در نوزادان مبتلا به هایپریلیک روبینیا، بویژه نوزادان نارس، ممنوع می باشد. مطالعات نشان داده است که سفتریاکسون قادر به جایگزینی بیلی رویین در این بیماران مطرح نمی باشد و لذا امکان ایجاد انسفالوپاتی ناشی از افزایش بیلی رویین در این بیماران مطرح نمی باشد.
8. استفاده از رقیق، کننده های حاوی کلسیم، مانند محلول ریتکر، به متوجه آماده سازی سفتریاکسون جهت تزریق، ممنوع می باشد.
9. مصرف سفتریاکسون در بیماران با سابقه حساسیت به پنی‌سیلین‌ها باید با احتیاط فراوان همراه باشد.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. در زیر مقدار مصرف معمولی این دارو آمده است:

بزرگسالان و نوجوانان :

۱ تا ۲ گرم هر ۲۴ ساعت یا ۵۰ تا ۱ گرم هر ۱۲ ساعت بصورت تزریق عمیق عضلانی یا انفوزیون وریدی. در درمان سوزاک ۲۵۰ میلیگرم بصورت تک دوز در عضله تزریق می شود.

نوزادان و کودکان :

۲۵ تا ۳۷/۵ میلیگرم به از، هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت یا ۵۰ تا ۷۵ میلیگرم به از، هر کیلوگرم

وزن بدن یک بار در روز بصورت تزریق عمیق عضلانی یا انفوزیون وریدی تجویز می شود. در درمان منتهی ابتدا ۱۰۰ میلیگرم به از، هر کیلوگرم وزن بدن و سیس ۱۰۰ میلیگرم به از، هر کیلوگرم هر ۱۴ ساعت بصورت یا ۵۰ میلیگرم به از، هر کیلوگرم هر ۱۲ ساعت تجویز می شود. (حداکثر مقدار تجویز روزانه در درمان منتهی ۴ گرم است).

تجویز آماده سازی و راههای تزریق :

برای انفوزیون وریدی ابتدا میزان ۵ میلی لیتر - برای ویالهای ۱/۵ گرمی ۱۰۰ میلیگرم به از، هر کیلوگرم هر ۱۴ ساعت تجویز می شود. (حداکثر مقدار تجویز روزانه در درمان منتهی ۴ گرم است).

۱ گرمی - آب سترنون قابل تزریق یا محلولهای تزریقی دکستروز ۵% یا ۱۰% یا سدیم کلراید ۹/۹% به ویالها افزوده بیس پس تا ۵۰ یا ۵۰ میلی لیتر رقیق کنید.

برای تزریق عمیق عضلانی محتويات ویالهای ۰/۰ گرمی و ۱ گرمی را به ترتیب در ۲ میلی لیتر و ۵/۳ میلی لیتر آب سترنون قابل تزریق، یا محلولهای لیدوکائین ۱%， دکستروز ۵% یا سدیم کلراید ۹/۹% حل کنید. محلولهای آماده برای تزریق را می توان تا ۱ روز در دمای اتاق و تا ۳ روز در یخچال نگهداری کرد. تومیه می شود پس از آماده سازی بالا مدلہ تزریق گرد.

موارد حافظه :

هر دارو بموازات اثرات درمانی دارای عوارض ناخواسته ای است که لزوماً همه آنها در یک بیمار دیده نمی شود.

در صورت بروز هر یک از عوارض زیر فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض شایع :

مدفعع سیاه قیری شکل، درد قفسه سینه، احساس سرما، سرفه، تب، ادرار دردناک یا مشکل در ادرار کردن، تنگی نفس، کلو درد، تورم غدد لنفاوی، خوشیزی یا کبودی غیر عادی، خستگی و ضعف غیر عادی.

عوارض با شیوع کمتر :

درد شدید معده یا شکم، حساسیت شکم به لمس، اسهال آبکی شدید و احیاناً خونی، کهیر، سرخری و خارش پوست یا بثورات جلدی، سرخری، تورم و درد در محل تزریق، نشیخ، جدا شدن لایه هایی از پوست.

گروهی دیگر از عوارض معمولی خودبخود مترعف می شوند. بهر حال در صورت تداوم و یا مزاحمت این عوارض به پزشک خود اطلاع دهید:

اسهال ملایم (بدون مشورت با پزشک از مصرف داروهای ضد اسهال خودداری کنید)، سردرد، زخم دهان یا زبان، کرامپ معدی ملایم، خارش یا ترشح مهبل.

نیز هرگونه عارضه احتمالی دیگر را به پزشک اطلاع دهید.

مسومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیشتر از مقدار تجویز شده فوراً با پزشک خود مشورت کنید.

شرایط نگهداری و تومیه های عمومی :

۱. دور از دسترس کوکان نگهداری شود.

۲. ویالها را قبل از آماده سازی در میان ۰/۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری کنید.

۳. از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

اشکال دارویی :

سفتریاکسون شرکت اکسیر بصورت ویالهای ۵۰ میلیگرمی و ۱ گرمی عرضه شده است.

راههای تماش با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:

تلفن ارتباط با مشتری (رایگان): ۰۲۱-۸۸۹۱۰۶۱۰

ایمیل: info@exir.co.ir

وب سایت: www.exir.co.ir



2205125/4