

ایبوکسیپر®

ایبوپروفن (سوسپانسیون خوراکی ۱۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر)

IBUXIR®

Ibuprofen (100mg / 5ml oral suspension)

مشخصات دارو:

ایبوکسیپر® شرکت داروسازی اکسیر به صورت سوسپانسیون خوراکی حاوی ۱۰۰ میلی گرم ایبوپروفن در هر ۵ میلی لیتر در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری و جعبه های تک عددی همراه با پیمانه و برگه راهنما به بازار عرضه می گردد.

دسته دارویی:

ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs)

راهنمایی های عمومی:

۱. قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود در موارد زیر مشورت نمایید:
 - وجود هر نوع سابقه حساسیت به آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و یا مواد دیگر نظیر مواد غذایی، مواد محافظ، رنگ ها و غیره.
 - ابتلا یا سابقه ابتلا به خونریزی های گوارشی، بیماری های التهابی دستگاه گوارش مانند کرون، کولیت، زخم معده یا دوازدهه، آسم (تنگی نفس)، لوپوس اریتماتوز، ناراحتی های قلبی، بالا بودن فشارخون، بیماری های کلیه، دیابت ملیتوس (دیابت شیرین)، هپاتیت یا دیگر بیماری های کبدی، هموفیلی، آتمی (کم خونی)، کاهش تعداد پلاکت های خون، وجود زخم یا نقاط سفید رنگ در دهان.
 - در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر:
 - کورتیکواستروئیدها، گلوکوکورتیکوئیدهای خوراکی، کورتیکوتروپین، مکمل های پتاسیم، داروهای ضد انعقاد خون، هپارین، داروهای ترومبولیتیک (مثل استرپتوکیناز)، تریامترن، آسپیرین، والپروئیک اسید، سیکلوسپورین، لیتیم، متوترکسات.
۲. سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
۳. قبل و بعد از هر بار مصرف، پیمانه را بشویید.
۴. از مصرف دارو بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری کنید.
۵. از مخلوط کردن سوسپانسیون ایبوپروفن با آنتی اسید یا هر گونه مایع دیگری قبل از مصرف خودداری ننماید.
۶. اگر می بایست دارو را برای یک مدت طولانی مصرف کنید، برای بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
۷. برای کاهش تحریکات گوارشی ناشی از این دارو، دارو را همراه با غذا مصرف کنید.
۸. در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت صرف نظر کرده مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید و مصرف دارو را طبق برنامه قبلی ادامه دهید.
۹. از مصرف همزمان این دارو با آنتی اسیدها خودداری کنید.
۱۰. این دارو جهت درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

حساسیت به ایبوپروفن سابقه اسم کهیر یا واکنش های حساسیتی به آسپیرین یا سایر NSAIDs، در تسکین درد جراحی های CABG*

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود. مقدار اندکی دارو در شیر ترشح می شود از این رو در مدت شیردهی مصرف این دارو توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

۱. اگر تحریکات گوارشی ناشی از مصرف این دارو (سوء هاضمه، تهوع، استفراغ، درد معده یا اسهال) ادامه یافت، پزشک معالج خود را مطلع کنید.
۲. قبل از انجام هر گونه عمل جراحی یا دندانپزشکی، پزشک خود را از مصرف این دارو آگاه سازید.
۳. استفاده از دو یا چند داروی ضد التهاب غیر استروئیدی با یکدیگر ممکن است اثرات ناخواسته دارو را افزایش دهد. بنابراین آسپیرین و سایر سالیسیلات ها، سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و همچنین استامینوفن را همراه با این دارو برای بیشتر از چند روز مصرف نکنید.
۴. این دارو ممکن است در برخی از افراد سبب گیجی، خواب آلودگی، سبکی سر یا تاری دید شود و منجر به کاهش سطح هوشیاری گردد، لذا در طول مدت مصرف این دارو قبل از حصول اطمینان از چگونگی واکنش نسبت به آن، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، اجتناب کنید.
۵. برخی از افرادی که داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مصرف می کنند، ممکن است نسبت به نور خورشید حساس شوند لذا در طول مصرف این دارو از قرار گرفتن در مقابل نور مستقیم خورشید خودداری کنید و در صورت لزوم از کرم ضد آفتاب و لباس های کاملاً پوشیده استفاده نمایید.

2205078/IR2

2205078/IR2

70M0417300
170*210 mm

*Coronary Artery Bypass Graft

EXIR 16.02.96
170 x 210 mm
287 U
Orange 021 U

۶. در صورت عدم بهبودی و یا بدتر شدن علائم به پزشک مراجعه کنید.
۷. اگر برای پایین آوردن تب از این دارو استفاده می کنید و تب بعد از سه روز قطع نشد یا دوباره برگشت، به پزشک مراجعه کنید.
۸. در صورتی که ناحیه دردناک، قرمز یا متورم بود به پزشک مراجعه کنید.

تداخلات دارویی:

مصرف هم زمان با داروهای ذیل ممکن است باعث کاهش یا افزایش اثر داروها گردد؛
 فرآورده های ضد انعقاد خون، آنتی پلاکت ها، NSAIDs آمینوگلیکوزیدها دفرآزیروکس، دایگاتران دیگوسین، بیس فسفونات ها، سیکلوسپورین، لیتیم، متوترکسات، مدرهای پتاسیمی، ACEIs.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند و باید دقیقاً از آن پیروی کرد، ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:
 - در درمان تب یا درد:

بزرگسالان و نوجوانان: ۴۰۰ - ۲۰۰ میلی گرم هر ۶ - ۴ ساعت در صورت نیاز.
 کودکان ۶ ماهه تا ۱۲ ساله: در ابتدا ۴۰-۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن برای تب کمتر از ۳۹°C و ۱۰ میلی گرم برای تب های بالاتر که می تواند در صورت نیاز هر ۶-۴ ساعت تکرار شود.

- در درمان آرتریت:

بزرگسالان و نوجوانان: ابتدا به میزان ۳۲۰۰ - ۱۲۰۰ میلی گرم روزانه در ۴ - ۳ دوز منقسم مصرف می شود. در صورت بهتر شدن علائم، پزشک ممکن است مقدار مصرف دارو را کاهش دهد.
 کودکان ۶ ماهه تا ۱۲ ساله: در ابتدا ۴۰-۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه ۴ - ۳ دوز منقسم مصرف می شود که این مقدار در صورت نیاز و بنا به دستور پزشک می تواند تا ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز افزایش پیدا کند و بعد از بهتر شدن علائم، پزشک ممکن است مقدار مصرف روزانه دارو را کاهش دهد.
 نوزادان زیر ۶ ماه: مقدار و نحوه مصرف بایستی توسط پزشک تعیین گردد.
 ایمنی و کارایی ایبوپروفن در کودکان زیر ۶ ماه به اثبات نرسیده است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، بعضی از این عوارض در صورت بروز ممکن است نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشد:
 - در صورت بروز هر یک از عوارض زیر، ضمن قطع دارو به پزشک مراجعه کنید:
 سوء هاضمه (طولانی یا شدید)، سوزش و درد شکم (شدید)، مدفوع خونی یا سیاه، بثورات جلدی، سردرد (شدید)، تورم انگشتان و پاها، افزایش غیر عادی وزن، برافروختگی و احساس گرما در پوست، علائم شبه آنفلوانزا (مثل احساس سرماخوردگی، تب و درد عضلانی) و آنافیلاکسی (این عارضه بسیار نادر و شامل علائم زیر است:
 تنگی نفس، تنفس سریع و نامنظم، خس خس سینه، درد قفسه سینه، از حال رفتن، تغییر رنگ صورت، تندی ضربان قلب یا نبض سریع و نامنظم، تورم پلک ها، صورت، زبان یا لب ها)
 - دسته دیگری از عوارض جانبی که ممکن است رخ دهد، آن هایی هستند که معمولاً نیازی به مراقبت های پزشکی ندارند و با ادامه درمان به خودی خود برطرف می شوند، با این وجود چنان چه هر یک از عوارض زیر ادامه پیدا کرد یا غیر قابل تحمل بود، موضوع را به پزشک خود اطلاع دهید:
 درد یا ناراحتی شکم یا معده (خفیف تا متوسط)، اسهال، گیجی، خواب آلودگی یا سبکی سر، سردرد (خفیف تا متوسط)، سوزش سر دل، سوء هاضمه، تهوع یا استفراغ.
 همچنین در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی دیگر که در این برگه راهنما ذکر نشده است، موضوع را به پزشک خود اطلاع دهید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده توسط پزشک، با مرکز فوریت های پزشکی تماس بگیرید.

شرایط نگهداری و توصیه های عمومی:

۱. قبل از مصرف، بطری را به خوبی تکان دهید.
۲. پس از هر بار مصرف، درب بطری را محکم ببندید.
۳. قبل و بعد از هر بار مصرف، پیمانته را بشویید.
۴. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
۵. از مصرف و نگهداری داروهای گذشته خودداری کنید.
۶. دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

ساخت شرکت داروسازی اکسیر - ایران

References:

1. USP DI, Advice for the patient Drug information in lay language, 2007 (27th edition), volume 1, pages: 164-174
2. Lexicomp drug information hand book, 2015 (23rd edition), pages: 1047-1048

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت:
 تلفن گویا: ۰۲۱ - ۸۸۹۱۰۹۱۰
 ایمیل: exir_cc@exir.co.ir
 وب سایت: www.exir.co.ir



2205078/IR2

2205078/IR2