

# SUPRANEM® Imipenem / Cilastatin

# سوپرانم® ایمی پنم / سیلاستاتین

این دارو جهت بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

## راهنمایی های عمومی

- ۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج خود مشورت کنید:
  - در صورت سابقه حساسیت به داروهای نظیر سفالوسپورین ها و پنی سیلین ها، سیکلوسپورین، گانسیکلوویر، پروبنسید و یا هر نوع دارو یا مواد دیگر.
  - در صورت ابتلا به بیماری های سیستم عصبی مرکزی (مانند بیماری های مغز و صرع) و بیماری های کلیوی
- ۲- دارو را در فواصل زمانی معین طبق دستور پزشک مصرف کنید.
- ۳- دوره درمان را کامل کنید.
- ۴- از مصرف و نگهداری دارو های تاریخ گذشته خودداری کنید. (۳)

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری در گروه C قرار دارد و باید با نظر پزشک متخصص باشد و در خانم های شیرده نیز به علت احتمال ترشح آن در شیر، مصرف این دارو حتماً با توصیه و نظر پزشک متخصص باشد. (۲)

## مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف این دارو برای بیماران مختلف متفاوت است و برای هر بیمار توسط پزشک تعیین می شود که باید به دقت از آن پیروی کرد. اطلاعات زیر تنها مقدار مصرف معمولی این دارو را نشان می دهد.

**بزرگسالان (بیماران بالای ۱۲ سال) :** ۲۵۰ میلی گرم تا ۱ گرم هر ۶ تا ۸ ساعت به صورت انفوزیون وریدی  
**کودکان زیر ۱۲ سال:** مقدار مصرف باید توسط پزشک تعیین شود. (۲)

## نحوه آماده سازی و راه های تزریق :

برای آماده سازی ویال ها مقدار ۲۰ میلی لیتر محلول سدیم کلراید ۰/۹ درصد یا دکستروز ۵ درصد به ویال افزوده و هم بزنید. سوسپانسیون حاصل را به طرف حاوی حداقل ۱۰۰ میلی لیتر از همان حلال (سدیم کلراید ۰/۹ درصد یا دکستروز ۵ درصد) منتقل کنید و خوب بهم بزنید تا محلول شفاف شود. این محلول را به صورت انفوزیون وریدی طی مدت حداقل ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تزریق کنید (در صورت ایجاد حالت تهوع سرعت تزریق را کم کنید). (۳)

**توجه:** پس از آماده سازی نهایی و قبل از تزریق محلول آماده شده در صورت مشاهده کدورت یا هر گونه ذرات خارجی و یا تغییر رنگ به قهوه ای از تزریق خودداری نمایید. رنگ پودر سفید تا زرد کم رنگ است و محلول آماده تزریق شفاف و بی رنگ تا زرد رنگ می باشد.

**توجه:** در صورت تجویز این دارو همراه با آنتی بیوتیک های دیگر از مخلوط کردن آن ها با یکدیگر هنگام تزریق خودداری کنید.

**توجه:** این دارو را جهت تزریق وریدی به صورت مستقیم به کار نبرید. (۱)

## هشدارها :

- در صورت بروز اسهال شدید فوراً به پزشک خود اطلاع دهید. همچنین در صورت بروز اسهال خفیف بدون مشورت با پزشک از مصرف دارو های ضد اسهال خودداری کنید.
- از حلال هایی که حاوی بنزیل الکل است جهت انفوزیون وریدی این دارو برای کودکان استفاده نکنید. (۲)
- این دارو در افراد مبتلا به مننژیت منع مصرف دارد. (۳)

## مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی، بیش از مقادیر تجویز شده فوراً به پزشک اطلاع دهید. (۳)

## عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی دارای عوارض ناخواسته ای است که بعضی از این عوارض در صورت بروز ممکن است نیاز به به مراقبت پزشکی داشته باشد

در صورت بروز عوارض زیر در اسرع وقت با پزشک خود تماس بگیرید :

**عوارض شایع :** اغتشاش شعور، تشنج، منگی، درد در محل تزریق، بثورات پوستی، کبیر یا خارش، تب، خس خس سینه، رعشه .

**عوارض با شیوع کمتر :** افزایش تعریق، تهوع و استفراغ، خستگی و ضعف غیر عادی

**عوارض نادر :** کرامپ و درد شدید شکم و معده، اسهال آبکی شدید که ممکن است خونی باشد (تا چند هفته بعد از قطع دارو نیز این عوارض ممکن است رخ دهد).

همچنین در صورت بروز هر عارضه دیگر با پزشک خود مشورت کنید. (۲)

## شرایط نگهداری :

۱- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

۲- ویال ها را قبل از اختلاط با حلال در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و درون جعبه نگهداری کنید.

۳- این دارو پس از آماده سازی تا ۴ ساعت در دمای اتاق و تا ۱۲ ساعت در یخچال قابل نگهداری می باشد. (۳)

## اشکال دارویی :

اشکال تزریقی ایمی پنم / سیلاستاتین شرکت اکسیر به صورت ویال های ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرمی جهت انفوزیون وریدی عرضه شده است.

ساخت کارخانه داروسازی اکسیر - ایران

## References:

- 1) PDR, 58<sup>th</sup> edition, 2004
- 2) USP DI, Advice for the patient 24<sup>th</sup> edition, 2004
- 3) Drugfacts, 60<sup>th</sup> edition, 2006
- 4) USP DI, Information for the Health care professional 24<sup>th</sup> edition, 2004

راه های تماس با شرکت و ارائه هرگونه پیشنهاد یا شکایت :

تلفن گویا : ۰۲۱ - ۸۸۹۱۰۹۱۰

ایمیل : [exir\\_cc@exir.co.ir](mailto:exir_cc@exir.co.ir)

وب سایت : [www.exir.co.ir](http://www.exir.co.ir)



2205695 / I R4